

DRUG

INFORMATION

2001 No. 1

岐阜大学医学部附属病院薬剤部  
医薬品情報管理室（内線2834）

平成13年1月4日発行

## 目 次

### 1 . 院外処方医薬品について

- 平成 13 年 1 月 1 日追加登録薬品 - ..... 1
- 平成 13 年 1 月 16 日追加登録薬品 - ..... 2

## 院外処方医薬品について

平成 13 年 1 月 1 日追加登録薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
ディオバン錠(バルサルタン)	80mg/錠	アンジオテンシンⅡ受容体阻害薬	ノバルティスファーマ
ゼペリン点眼液(アシタザノラスト)	[0.1%] 5mL/本	アレルギー性結膜炎治療剤	興和
リレンザ(ザナミビル水和物)	5mg/プシター (4プシター/枚)	抗インフルエンザウイルス剤	グラクソ・ウエルカム

\*バルサルタン Valsartan

【商】ディオバン Diovan

ノバルティスファーマ

内用：錠剤 1錠中80mg

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者，妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

【効】高血圧症

【用】1日1回40～80mgを投与する。1日160mgまで増量できる。

【副】血管浮腫，肝炎，腎不全，過度の血圧低下に伴う失神・意識喪失，蕁麻疹，発疹，めまい，頭痛，眠気，白血球減少，好酸球増多，赤血球減少，ヘモグロビン減少，ヘマトクリット減少，低血圧，動悸，腹痛，下痢，便秘，嘔気，嘔吐，AST・ALT・LDH上昇，Al-P・ビリルビン値上昇，咳嗽，咽頭炎，尿酸値上昇，BUN・クレアチニン上昇，カリウム値上昇，倦怠感，CK上昇，浮腫，胸痛，血糖値上昇，コレステロール上昇，疲労感，総蛋白減少

【妊】不可

【授】回避，やむを得ない場合は授乳中止

【未・新・乳・幼・小】未確立

\*アシタザノラスト水和物 Acitazanolast Hydrate

【商】ゼペリン Zepelin 興和

外用：点眼剤 0.1% (5mL)

【効】アレルギー性結膜炎

【用】1回1～2滴，1日4回(朝，昼，夕方及び就寝前)点眼する。

【副】眼刺激，眼痛，流涙増加，結膜浮腫，眼瞼浮腫，眼充血

【妊・授】未確立，有益のみ

【小】未確立

\*ザナミビル水和物 Zanamivir Hydrate

【商】リレンザ Relenza

グラクソ・ウエルカム

外用：吸入剤 1プシター中5mg

【警】1. 本剤を治療に用いる場合は，本剤の必要性を慎重に検討すること。2. 本剤の予防投与における有効性及び安全性は確立していない。

【禁】本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

【効】A型又はB型インフルエンザウイルス感染症

【用】1回10mgを1日2回，5日間，専用の吸入器を用いて吸入する。

【副】アナフィラキシー様症状，気管支攣縮，呼吸困難，発疹，蕁麻疹，顔面浮腫，頭痛，手指のしびれ感，不眠症，下痢，咽頭乾燥，口渇，口内炎，舌あれ，食欲不振，胃部不快感，悪心・嘔吐，嘔声，咽頭刺激感，鼻道刺激感，喘鳴，鼻出血，鼻漏，痰，耳鳴，臭覚障害，動悸，発汗，発熱，頸部痛，背部痛

【妊】未確立，有益のみ

【授】未確立，授乳回避

【小】未確立

平成 13 年 1 月 16 日追加登録薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
マイスリー錠(酒石酸ゾルピデム)	5mg, 10mg/錠	入眠剤	藤沢

\* 酒石酸ゾルピデム Zolpidem Tartrate

【商】マイスリー Myslee 藤沢

内用：錠剤（向） 1 錠中 5mg, 10mg

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者，重篤な肝障害のある患者，重症筋無力症の患者，急性狭隅角緑内障の患者，肺性心・肺気腫・気管支喘息及び脳血管障害の急性期などで呼吸機能が高度に低下している場合

【効】不眠症（精神分裂病及び躁うつ病に伴う不眠症は除く）

【用】1 回 5～10mg を就寝直前に投与する。高齢者には 1 回 5mg から投与を開始する。1 日 10mg を超えないこととする。

【副】薬物依存，減量・中止による離脱症状，錯乱，幻覚，興奮，脱抑制，一過性前向性健忘，呼吸抑制，炭酸ガスナルコーシス，ふらつき，眠気，頭痛，残眠感，頭重感，めまい，不安，悪夢，気分高揚，白血球増多，白血球減少，ALT・ $\gamma$ -GTP・AST・LDH 上昇，蛋白尿，悪心，嘔吐，食欲不振，腹痛，下痢，動悸，発疹，痒感，倦怠感，疲労，下肢脱力感，口渇，複視，不快感，錯視

【妊】未確立，有益のみ

【授】回避，やむを得ない場合は授乳回避

【未・新・乳・幼・小】未確立

【貯】分割後遮光