

DRUG

INFORMATION

2002 No. 1

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室（内線2834）

平成14年1月16日発行

目 次

1. 院外処方医薬品について

ー平成 14 年 1 月 1 日新規登録薬品ー	1
ー平成 14 年 1 月 16 日新規登録薬品ー	2

※ Drug Information は医学部ホームページの下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/index.htm>

院外処方医薬品について

平成 14 年 1 月 1 日新規登録薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
ノボラピッド注(インスリンアスパルト)	300 単位／3mL／筒	インスリン製剤	ノボ・ノルディスクファーマ

＊インスリンアスパルト Insulin Aspart

【商】ノボラピッド NovoRapid

ノボ・ノルディスクファーマ

注射：液剤（劇） 1 筒（3mL）中 300 単位

【禁】低血糖症状を呈している患者，本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病

【用】初期は 1 回 2～20 単位を毎食直前に，専用のインスリン注入器を用いて皮下注する。持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量は 1 日 4～100 単位である。

【副】低血糖，アナフィラキシーショック，血管神経性浮腫，アレルギー，蕁麻疹，発疹，痒痒感，血圧降下，肝機能障害，食欲不振，嘔気，腹痛，治療後神経障害，屈折異常，糖尿病網膜症の顕在化・増悪，注射部位の疼痛・発赤・腫脹・硬結・リポディストロフィー・発疹・痒痒感，呼吸困難，浮腫，発熱，倦怠感，めまい

【妊】注意

【小】注意

【貯】遮光，2～8℃

平成 14 年 1 月 16 日新規登録薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
クリアナール錠(フドステイン)	200mg／錠	気道分泌細胞正常化剤	三菱ウェルファーマ
グリベックカプセル(メシル酸イマチニブ)	100mg／Cp	抗悪性腫瘍剤	ノバルティスファーマ

＊フドステイン Fudosteine

【商】クリアナール Cleanal

三菱ウェルファーマ

内用：錠剤 1 錠中 200mg

【効】以下の慢性呼吸器疾患における去痰：気管支喘息，慢性気管支炎，気管支拡張症，肺結核，塵肺症，肺気腫，非定型抗酸菌症，びまん性汎細気管支炎

【用】1 回 400mg を 1 日 3 回食後投与する。

【副】Stevens-Johnson 症候群，Lyell 症候群，肝機能障害，黄疸，食欲不振，悪心・嘔吐，腹痛，胃痛，胃部不快感，胸やけ，腹部膨満感，口渇，下痢，便秘，AST・ALT・Al-P 上昇，BUN 上昇，蛋白尿，発疹，紅斑，かゆみ，頭痛，ふらつき，しびれ感，めまい，耳鳴，味覚異常，熱感，顔面潮紅，脱力感，胸部圧迫感，頻尿

【妊】有益のみ 【授】授乳中止

【小】未確立

＊メシル酸イマチニブ Imatinib Mesilate

【商】グリベック Glivec

ノバルティスファーマ

内用：カプセル剤（劇） 1 個中 100mg

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者，妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

【効】慢性骨髄性白血病

【用】○慢性期：1 日 1 回 400mg を食後に投与する。1 日 1 回 600mg まで増量できる。○移行期または急性期：1 日 1 回 600mg を食後に投与する。1 日 800mg（400mg を 1 日 2 回）まで増量できる。

【副】白血球減少，好中球減少，血小板減少，貧血，脳出血，硬膜下出血，消化管出血，肝機能障害，黄疸，胸水，肺水腫，腹水，心膜滲出液，うっ血性心不全，肺炎，急性腎不全，発疹，掻痒，角化症，紅斑，頭痛，不眠，頭重感，眠気，回転性眩暈，めまい，末梢神経障害，関節痛，筋肉痛，筋痙直，筋痙攣，骨痛，全身性関

節痛，腰痛，嘔気，嘔吐，胸やけ，下痢，味覚異常，腹部不快感，消化不良，口腔アフタ，口内炎，歯周炎，胃炎，心窩部痛，血便，食欲不振，腹痛，便秘，LDH 上昇・低下，AST・ALT・Al-P・総ビリルビン上昇，血清カリウム上昇・低下，血清ナトリウム低下，血清カルシウム低下，血清リン上昇・低下，血清アルブミン低下，尿酸値上昇・低下，血糖値上昇・低下，血清総蛋白上昇・低下，プロトロンビン時間延長・短縮，APTT 延長，フィブリノーゲン増加・減少，FDP 上昇，呼吸困難，鼻・咽頭炎，咽喉頭痛，急性上気道炎，咳嗽，リンパ球減少症，鼻出血，白血球增多，血小板增多，好酸球增多症，血腫，舌血腫，紫斑，結膜下出血，点状出血，斑状出血，クレアチニン・BUN 上昇，尿蛋白，尿潜血，尿沈渣異常，尿中ウロビリノーゲン増加，表在性浮腫，全身浮腫，下肢浮腫，倦怠感，悪寒，ACTH 上昇，TSH 上昇，脱力，寝汗，体重増加，感染，口唇ヘルペス，疣贅，眼充血，眼掻痒感，頭皮痛，疼痛，疲労感，発熱，発汗

【妊】不可 【授】授乳中止

【未・新・乳・幼・小】未確立