

DRUG

INFORMATION

2003 No. 6

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室（内線2834）

平成15年3月7日発行

目 次

1. 医薬品の採用・採用中止について 1
—平成 15 年 3 月 6 日の薬事委員会結果—
2. 院内処方医薬品について 7

※ Drug Information は医学部ホームページの下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/index.htm>

医薬品の採用・採用中止について

院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
クラリチン錠(ロラタジン)	10mg/錠	アレルギー性疾患治療剤	塩野義
ミカルディスカプセル(テルミサルタン)	40mg/Cp	アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤	ベーリンガーインゲルハイム
リスパダール内用液(リスペリドン)	1mg/mL	抗精神病剤	ヤンセンファーマ
デタントール点眼液(塩酸ブナゾシン)	[0.01%] 5mL/本	緑内障・高眼圧症治療剤	参天
プロスタンデン軟膏(アルプロスタジルアルファデクス)	[0.003%] 10g/本	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	小野
アンナカ注(安息香酸ナトリウムカフェイン)	200mg/1mL/A	中枢興奮・鎮痛剤	扶桑
シムレクト注射用(バシリキシマブ)	20mg/V	急性拒絶反応抑制剤	ノバルティスファーマ
ドパストン注射液(レボドパ)	50mg/20mL/A	パーキンソンニズム治療剤	三共
ファンガード点滴用(ミカファンギンナトリウム)	50mg/V	キャンディン系抗真菌剤	藤沢
フルカリック 1号	903mL/袋	高カロリー輸液用剤	田辺
フルカリック 2号	1,003mL/袋	高カロリー輸液用剤	田辺
ブレビブロック注(塩酸エスモロール)	100mg/10mL/V	短時間作用型β ₁ 遮断剤	丸石
リゾピスト注(フェルカルボトラン)	44.6mg/1.6mL/V	MRI 用肝臓造影剤	シェーリング

院内採用医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
アーチスト錠(カルベジロール)	10mg/錠	β遮断剤	第一
ガチフロ錠(ガチフロキサシン)	100mg/錠	ニューキノロン系抗菌剤	大日本
グリベックカプセル(メシル酸イマチニブ)	100mg/Cp	抗悪性腫瘍剤	ノバルティスファーマ
タケブロン OD 錠(ランソプラゾール)	15mg/錠	プロトンポンプ阻害剤	武田
タミフルドライシロップ(リン酸オセルタミビル)	30mg/g	抗インフルエンザウイルス剤	中外
ドオルトン錠(配合剤)	合剤	黄体・卵胞ホルモン剤	シェーリング
バルトレックス錠(塩酸バラシクロビル)	500mg/錠	抗ウイルス化学療法剤	グラクソ・スミスクライン
パルミコート 200 タービュヘイラー(ブデソニド)	11.2mg/本	吸入式ステロイド剤	アストラゼネカ
アズノールうがい液(アズレンスルホン酸ナトリウム)	5mL/本	アズレン含嗽液	日本新薬
デュロテップパッチ(フェンタニル)	5mg/枚	持続性癌疼痛治療剤	協和醗酵
注射用オノアクト(塩酸ランジオロール)	50mg/V	β遮断剤	小野
オムニパークシリンジ 300(イオヘキソール)	150mL/本	非イオン性造影剤	第一
オメガシン点滴用(ピアペネム)	0.3g/V	カルバペネム系抗生物質製剤	明治
クリアクター注(モンテプララーゼ)	80 万国単位/V	血栓溶解剤	エーザイ
パシル点滴静注液(メシル酸バズフロキサシン)	500mg/錠	ニューキノロン系抗菌剤	富山化学
プロハンスシリンジ(ガトテリドール)	3.63g/13mL/筒	非イオン性 MRI 用造影剤	エーザイ
リュープリン SR 注射用キット(酢酸リュープロレリン)	11.25mg/キット	前立腺癌治療剤	武田

院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
立効散エキス顆粒	2.5g/包	漢方製剤	ツムラ
パファリン錠 330mg(アスピリン, ダイアルミネート)	合剤	解熱鎮痛消炎剤	ライオン
ミルラクト細粒(チラクターゼ)	0.5g/包	乳糖分解酵素剤	塩野義
アイトロイチン点眼液(コンドロイチン硫酸ナトリウム)	[1%] 5mL/本	角膜保護点眼剤	参天
イントラリポス(ダイズ油)	[20%] 250mL/袋	静注用脂肪乳剤	大塚
ウインセフ点滴用(硫酸セフォセリス)	1g/V	セフェム系抗生物質製剤	藤沢
シオゾール注(金チオリンゴ酸ナトリウム)	10mg/1mL/A	金製剤	塩野義
テラブテック静注(ジモルホラミン)	45mg/3mL/A	呼吸促進剤	エーザイ
ヘパリン Na ロック 100 シリンジ(ヘパリンナトリウム)	1,000 単位/10mL/筒	ヘパリンロック液	三菱ウェルファーマ

※在庫がなくなり次第, 処方中止とします。

販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
グリソピン-FP 錠(グリセオフルビン)	125mg/錠	抗真菌剤	三共
バリダーゼ局所用(ストレプトキナーゼ, スレプトドルナーゼ)	合剤	線維素・壊死組織溶解酵素剤	ワイズレダリー
ベノキシールゼリー(塩酸オキシブプロカイン)	[0.2%] 20mL, 100mL/本	表面麻酔剤	参天
アールプリン(抗ヒトリンパ球ウマ免疫グロブリン)	500mg/V	拒否反応抑制剤	三菱ウェルファーマ
セクレパン注(セクレチン)	50 セクレチン単位/A	胃・十二指腸潰瘍治療剤	エーザイ
ヒューマリン R 注(ヒトインスリン)	[40 単位/mL] 10mL/V	インスリン製剤	イーライリリー
ヒューマリン N 注(ヒトインスリン)	[40 単位/mL] 10mL/V	インスリン製剤	イーライリリー

※在庫がなくなり次第, 処方中止とします。

院外処方医薬品(追加分)

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
アストリックドライシロップ(アシクロビル)	800mg/g	抗ウイルス化学療法剤	日本化薬
スオード錠(プルリフロキサシン)	100mg/錠	ニューキノロン系抗菌剤	明治
ミカルディスカプセル(テルミサルタン)	20mg, 40mg/Cp	アンジオテンシン II 受容体拮抗剤	ベーリンガーインゲルハイム
ランサップ(ランソプラゾール, アモキシシリン, クラスロマイシン)	合剤 [400, 800]	ヘリコバクター・ピロリ除菌剤	武田
エイゾプト点眼液(プリンゾラミド)	[1%] 5mL/本	眼圧下降剤	アルコン
ダラシン T ゲル(リン酸クリンダマイシン)	[1%] 10g/本	外用抗生物質製剤	佐藤
プレドネマ注腸(リン酸プレドニゾロンナトリウム)	20mg/60mL/本	潰瘍性大腸炎治療剤	日清キョーリン
ヒューマリン 3/7 注(ヒトインスリン)	[100 単位/mL] 10mL/V	インスリン製剤	イーライリリー

院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
オルヂスカプセル(ケトプロフェン)	25mg/Cp	非ステロイド系抗炎症剤	アボット・ジャパン
スルガム錠(チアプロフェン酸)	200mg/錠		アベンティスファーマ
ナポール SR カプセル(ジクロフェナクナトリウム)	37.5mg/Cp		エスエス
バキソカプセル(ピロキシカム)	10mg/Cp		富山化学
フェルデンサポジットリ(ピロキシカム)	20mg/個		ファイザー
イソミタール末(アモバルビタール)	原末	催眠・鎮静剤	日本新薬
ブロバリン末(プロムワレリル尿素)	原末		〃
コントロール散(クロルジアゼボキシド)	100mg/g	抗不安剤	武田
メンドンカプセル(クロラゼブ酸二カリウム)	7.5mg/Cp		大日本
ウインタミン錠(塩酸クロルプロマジン)	50mg/錠	抗精神病剤	塩野義
クレミン顆粒(塩酸モサブラミン)	100mg/g		三菱ウェルファーマ
デフェクトン糖衣錠(塩酸カルピプラミン)	25mg/錠		〃
トロペロン錠(チミペロン)	1mg/錠		第一
バルネチール細粒(塩酸スルトプリド)	500mg/g		大日本
プロピタン錠(塩酸フロロピバミド)	50mg/錠		エーザイ
リントン錠(ハロペリドール)	2mg/錠		三菱ウェルファーマ
レスリン錠(塩酸トラゾドン)	25mg/錠	抗うつ剤	オルガノン
ムスカルム D 錠(塩酸トルペリゾン)	100mg/錠	痙縮・筋緊張治療剤	日本化薬
リンラキサー錠(カルバミン酸クロルフェネシン)	125mg, 250mg/錠		大正
アップノール B 錠(メシル酸プロモクリプチン)	2.5mg/錠	パーキンソン病治療剤	塩野義
パーキン散(ヒベンズ酸プロフェナミン)	100mg/g		三菱ウェルファーマ
ヒデルギン舌下錠(メシル酸ジヒドロエルゴトキシン)	1mg/錠	脳循環改善剤	ノバルティスファーマ
イノキテンカプセル(ユビデカレノン)	5mg/Cp	強心剤	ケミファ
バスタレル F 錠(塩酸トリメタジジン)	3mg/錠	抗狭心症剤	住友
ブロクリン-L カプセル(ピンドロール)	15mg/Cp	β遮断剤	塩野義
ベトリロール-L カプセル(塩酸ブニトロロール)	20mg/Cp		ベーリンガーインゲルハイム
エラスチーム錠(エラスターゼ)	1,800 単位/錠	高脂血症用剤	エーザイ
炭酸マグネシウム末	原末	酸中和剤	健栄
グルマル顆粒(アセグルタミドアルミニウム)	70%	防御因子強化剤	協和醗酵
ソロン細粒(ソファルコン)	100mg/g		大正
メサフィリン末	合剤		エーザイ
ネオ・ユモール末	合剤	消化性潰瘍治療剤	ベーリンガーインゲルハイム
アボビスカプセル(ナバジシル酸アクラトニウム)	25mg/Cp	副交感神経興奮剤	富山化学
コスパノン錠(フロプロピオン)	40mg/錠	鎮痙剤	エーザイ
コリオパン錠(臭化ブトロピウム)	10mg/錠		〃
ダクチル錠(塩酸ピペリドレート)	50mg/錠		キッセイ
希塩酸	9.5~10.5W/V%	酸類製剤	丸石
ジアスターゼ末	原末	総合消化酵素	丸石
パンクレアチン末	原末		吉田

院外採用中止医薬品(つづき)

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
トランコロン P 錠	合剤	過敏性腸症候群治療剤	藤沢
ノボリン R 注(ヒトインスリン)	1,000 単位/10mL/V	インスリン製剤	ノボ・ノルディスクファーマ
ノボレット R 注(ヒトインスリン)	150 単位/1.5mL/筒		〃
ノボレット R 注, N 注(ヒトインスリン)	各 300 単位/3mL/筒		〃
ノボレット 20R 注, 40R 注, 50R 注(ヒトインスリン)	各 300 単位/3mL/筒		〃
ペンフィル 40R 注(ヒトインスリン)	300 単位/3mL/筒		〃
ラスチノン錠(トルブタミド)	500mg/錠	経口血糖降下剤	アベンティスファーマ
ラスチノン末(トルブタミド)	原末		〃
パラメゾン錠(酢酸パラメタゾン)	2mg/錠	副腎皮質ホルモン製剤	田辺
ロ・リンデオール錠	合剤	女性ホルモン製剤	三共
コバマイド錠(コバマミド)	250μg/錠	ビタミン製剤	協和醗酵
メコラミンカプセル(メコバラミン)	250μg/Cp		科研
パントシン錠(パンテチン)	30mg/錠	パントテン酸	第一
スローフィー錠(乾燥硫酸鉄)	50mg/錠	鉄剤	ノバルティスファーマ
オファルム K 錠	合剤	止血剤	三菱ウェルファーマ
トロンビン局所用	5,000 単位/V	凝固因子製剤	三共
ノバクト M(乾燥濃縮人血液凝固第IX因子)	500 単位/10mL/V		藤沢
クリニミール	89g/包	経腸栄養剤	エーザイ
ヨウレチン錠(ヨウ素レシチン)	100μg/錠	無機質製剤	第一薬品
ブライアン S 錠(エデト酸二ナトリウムカルシウム)	500mg/錠	重金属中毒治療剤	日新
チオクタン細粒(チオクト酸アミド)	100mg/g	他の中毒治療剤	藤沢
セフспанカプセル(セフィキシム)	50mg/Cp	セフェム系抗生物質製剤	藤沢
トスキサシン錠(トシル酸トスフロキサシン)	150mg/錠	ニューキノロン剤	大日本
フルマーク錠(エノキサシン)	100mg, 200mg/錠		〃
ロメバクトカプセル(塩酸ロメフロキサシン)	100mg/Cp		塩野義
ファンシダール錠	合剤	寄生虫・原虫用剤	中外
ミンテゾール錠(チアベンダゾール)	500mg/錠		萬有
メベンダゾール錠(メベンダゾール)	100mg/錠		ヤンセンファーマ
アフエマ錠(塩酸ファドロゾール水和物)	1mg/錠	ホルモン剤	ノバルティスファーマ
ホンバン錠(ホスフェストロール)	100mg/錠		杏林
パクシダール点眼液(ノフロキサシン)	[0.3%] 5mL/本	抗菌剤	杏林
ネオ・ロイコマイシントローチ H(アセチルキタサマイシン)	4mg/錠	抗生物質	旭化成
アデスタン G 錠(硝酸イソコナゾール)	300mg/錠	化学療法剤	シェーリング
エクセルダームクリーム(硝酸スルコナゾール)	10g/本	抗真菌剤	田辺
エクセルダームソリューション(硝酸スルコナゾール)	10mL/本		〃
ステイバン(フルルビプロフェン)	10×14cm/枚	消炎・鎮痛パップ剤	三菱ウェルファーマ
チトカーマ錠(チトクローム C)	10mg/錠	細胞呼吸賦活剤	ゼリア

院外採用中止医薬品(つづき)

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
カネボウ当帰芍薬散料エキス細粒	2g/包	漢方製剤	カネボウ
コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	2g/包		小太郎
コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒	3g/包		〃
コタロー補中益気湯エキス細粒	2g/包		〃
ツムラ乙字湯エキス顆粒	2.5g/包		ツムラ
ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ五淋散エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ帰脾湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ参蘇飲エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ柴陷湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ口帰膠艾湯エキス顆粒	3g/包		〃
ツムラ麻杏口甘湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ神秘湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ治打撲一方エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ竹口温胆湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ五虎湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ当帰湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ胃苓湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ三物黄口湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ桂枝茯苓丸加口苡仁エキス顆粒	2.5g/包		〃
ツムラ大承気湯エキス顆粒	2.5g/包		〃
ゲンチアナ末	原末	生薬製剤	丸石
ツムラの生薬ヨクイニン末	原末		ツムラ
サンドスタチン注射液(酢酸オクトレオチド)	50μg/1mL/A	成長ホルモン分泌抑制因子製剤	ノバルティスファーマ

※3月31日付で処方中止とします。

院外販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
アパミン顆粒(プロペリシアジアジン)	100mg/g	抗精神病剤	三菱ウェルファーマ
トロペロン S 細粒(チミペロン)	10mg/g		第一
ザロンチンカプセル(エトスクシミド)	250mg/Cp	抗てんかん剤	三共
ブリカニール細粒(硫酸テルブタリン)	10mg/g	気管支拡張剤	藤沢
アトロベント(臭化イプラトロピウム)	7mL/本		帝人
カフコデ錠	合剤	鎮咳剤	メルク・ホエイ
ノボリン 30R 注(ヒトインスリン)	400 単位/10mL/V	インスリン製剤	ノボ・ノルディスクファーマ
ヒューマカート R 注, N 注, 3/7 注(ヒトインスリン)	各 150 単位/1.5mL/筒		イーライリリー
モノタード注(ヒトインスリン)	400 単位/10mL/V		ノボ・ノルディスクファーマ
エピスタ点眼液(エピネフリン)	[1.25%] 5mL/本	緑内障治療剤	千寿

※3月31日付で処方中止とします。

院内処方医薬品について

*ロラタジン Loratadine

【商】クラリチン Claritin 塩野義

内用：錠剤 1錠中10mg

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【効】アレルギー性鼻炎，蕁麻疹，皮膚疾患（湿疹・皮膚炎，皮膚癢痒症）に伴う癢痒

【用】1回10mgを1日1回，食後に投与する。

【副】ショック，てんかん 眠気，倦怠感，めまい，頭痛，咽頭痛，鼻の乾燥感，腹痛，口渇，嘔気・嘔吐，下痢，便秘，口唇乾燥，発疹，AST・ALT・ビリルビン値・Al-P・ γ -GTP 上昇，蛋白尿，BUN 上昇，動悸，好酸球増多，白血球・好中球減少，単球増多，リンパ球減少，白血球・リンパ球増多，ヘマトクリット値・ヘモグロビン減少，好塩基球増多，血小板減少，尿糖，眼球乾燥，耳鳴，ほてり

【妊】回避

【授】回避，やむを得ない場合は授乳回避

【未・新・乳・幼・小】未確立

*テルミサルタン Telmisartan

【商】ミカルディス Micardis

ベーリンガーインゲルハイム

内用：カプセル剤 1個中40mg

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者，妊婦又は妊娠している可能性のある婦人，胆汁の分泌が極めて悪い患者又は重篤な肝障害のある患者

【効】高血圧症

【用】1日1回40mgを投与する。1日20mgから投与を開始し漸次増量する。1日最大投与量は80mgまでとする。

【副】血管浮腫，高K血症，腎不全，失神・意識喪失，肝機能障害，黄疸 癢痒，発疹，蕁麻疹，めまい，頭痛，眠気，頭のぼんやり感，不安感，白血球減少，ほてり，心悸亢進，ふらつき，上室性期外収縮，心房細動，上室性頻脈，腹痛，下痢，嘔気，食欲不振，消化不良，胃炎，口渇，口内炎，AST・ALT・Al-P・LDH 上昇，咳，喀痰増加，咽頭炎，クレアチニン・尿酸値上昇，K 上昇，耳鳴，倦怠感，CRP 陽性，CK

上昇，浮腫，脱力感，発熱，頻尿，結膜炎，目のチカチカ感，羞明

【妊】不可

【授】回避，やむを得ない場合は授乳中止

【未・新・乳・幼・小】未確立

*リスペリドン Risperidone

【商】リスパダール Risperdal

ヤンセンファーマ

内用：液剤[㊦] 1mL中1mg

【禁】昏睡状態の患者，バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者，エピネフリンを投与中の患者，本剤の成分に対し過敏症の患者

【効】精神分裂病

【用】1回1mg，1日2回より始め，徐々に増量する。維持量は1日2～6mgを原則として1日2回に分割投与する。1日量は12mgを超えないこと。

【副】悪性症候群，遅発性ジスキネジア，SIADH，肝機能障害，黄疸，横紋筋融解症，心房細動，心室性期外収縮，脳血管障害 麻痺性イレウス 発疹，頻脈，血圧低下，起立性低血圧，心電図異常，動悸，高血圧，不整脈，末梢循環不全，パーキンソン症候群，アカシジア，ジスキネジア，ジストニア，肝機能異常，視調節障害，便秘，悪心・嘔吐，食欲不振・亢進，下痢・腹痛，胃不快感，腹部膨満感，月経異常，乳汁分泌，射精障害，高プロラクチン血症，女性型乳房，勃起不全，排尿障害，尿閉，BUN・クレアチニン上昇，尿失禁，不安・焦燥，不眠，眠気，ふらつき，頭痛・頭重，興奮，抑うつ，妄想，めまい，過剰鎮静，幻覚，立ちくらみ，自殺企図，ぼんやり，痙攣発作，性欲異常，緊張，しびれ感，貧血，白血球増多・減少，血小板減少，倦怠感，口渇，CK 上昇，脱力感，疲労感，トリグリセライド上昇，体重増加，鼻閉，発汗，発熱，浮腫，高血糖

【妊】未確立，有益のみ 【授】授乳中止

【小】未確立

*塩酸ブナゾシン Bunazosin Hydrochloride

【商】デタントール Detantol 参天

外用：点眼剤 0.01% (5mL)

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【効】次の疾患において、他の緑内障治療薬で効果不十分な場合：緑内障，高眼圧症

【用】1回1滴，1日2回点眼する。

【副】眼瞼炎，眼瞼皮膚炎，角膜上皮障害，痒痒感，霧視，結膜充血，異物感，刺激感，頭痛

【妊】未確立，有益のみ 【授】未確立，不可，やむを得ない場合は授乳中止

【小】未確立

【貯】遮光

*アルプロスタジルアルファデクス

Alprostadil Alfadex

【商】プロスタンディン Prostandin 小野

外用：軟膏剤(調) 0.003% (10g)

【禁】重篤な心不全のある患者，出血（頭蓋内出血，出血性眼疾患，消化管出血，喀血等）している患者，妊婦又は妊娠している可能性のある婦人，本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【効】褥瘡，皮膚潰瘍（熱傷潰瘍，糖尿病性潰瘍，下腿潰瘍，術後潰瘍）

【用】潰瘍周囲から潰瘍部にかけて消毒・清拭した後，1日2回，適量をガーゼなどにのぼしてこれを潰瘍部に貼付するか，潰瘍部に直接塗布し，ガーゼなどで保護する。

【副】疼痛，刺激感，出血，接触性皮膚炎 痒痒，熱感，発赤，落屑，浮腫，滲出液増加

【妊】不可 【未・新・乳・幼・小】未確立

*安息香酸ナトリウムカフェイン

Caffeine and sodium benzoate

【商】アンナカ Annaca 扶桑

注射：液剤 1管 (1mL) 中 200mg

【効】眠気，倦怠感，血管拡張性及び脊椎穿刺後頭痛

【用】1回 0.1~0.4g を 1日 1~3 回皮下注，筋注又は静注する。

【副】振戦，頻脈，期外収縮，耳鳴，不眠，不穩

【妊・授】長期連用回避

*バシリキシマブ Basiliximab

【商】シムレクト Simulect

ノバルティスファーマ

注射：(調) 1瓶中 20mg

【警】本剤の投与は，免疫抑制療法及び臓器移植患者の管理に精通している医師のもとで使用すること。

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者，妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

【効】腎移植後の急性拒絶反応の抑制

【用】40mg を総用量とし，20mg ずつ 2 回に分けて静注する。初回投与は移植術前 2 時間以内に，2 回目の投与は移植術 4 日後に行う。

【副】急性過敏症反応，感染症 頭痛，痙攣，動眼神経麻痺，眼の異常感，複視，眼痛，眼のちらつき，咽喉痛，咳嗽，鼻漏，喀痰増加，喀痰喀出困難，下肢浮腫，血圧上昇，肺塞栓症，血管炎，静脈血栓症，貧血，リンパ球数減少，白血球増加，血小板・白血球減少，単球数減少，好中球数減少・増加，便秘，下痢，嘔気，LDH・AST・ALT・Al-P・ビリルビン・γ-GTP 増加，残余窒素上昇，蛋白尿陽性，クレアチニン・尿素増加，外科的創傷合併症，痒痒症，皮膚炎，高 K 血症，末梢性浮腫，疼痛，体重増加，高コレステロール血症，発熱，CRP 増加，悪寒，胸痛，倦怠感，良性下垂体腫瘍，関節痛，筋痛，リン酸塩減少，トリグリセライド増加，アルブミン減少，糖尿陽性，抗体異常

【妊】未確立，不可

【授】4 ヶ月以内：授乳回避

【未・新・乳・幼・小】未確立

【貯】2~8℃

*レボドパ Levodopa

【商】ドパストン Dopaston 三共

注射：液剤 1管 (20mL) 中 50mg

【禁】閉塞隅角緑内障の患者，本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者，非選択的 MAO 阻害剤を投与中の患者

【効】パーキンソン病，パーキンソン症候群

【用】1日 25~50mg を 1~2 回に分けて，そのままゆっくり静注又は生理食塩液もしくはブドウ糖注射液などに希釈して点滴静注する。

【副】悪性症候群，錯乱，抑うつ，幻覚，胃潰瘍・十二指腸潰瘍の悪化，溶血性貧血 見当識

障害、味覚異常、不随意運動、頭痛・頭重感、不眠、妄想、興奮、眠気、めまい、倦怠感、便秘、唾液分泌過多、胸やけ、悪心・嘔吐、食欲不振、口渇、下痢、排尿異常、白血球・血小板減少、貧血、発疹、不整脈、血圧低下・上昇、心悸亢進、視覚異常、AST・ALT 上昇、浮腫、嘔声、発汗、筋肉痛、脱毛、尿・唾液の黒色着色、耳鳴、熱感、汗の黒色着色

【妊・授】回避

【貯】遮光

*ミカファンギンナトリウム

Micafungin Sodium

【商】ファンガード Funguard 藤沢

注射：液剤(劇) 1 瓶中 50mg

【禁】本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【効】アスペルギルス属及びカンジダ属による下記感染症：真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症

【用】○アスペルギルス症：1 日 1 回 50～150mg を点滴静注する。重症又は難治性アスペルギルス症には症状に応じて増量できるが、1 日 300mg を上限とする。○カンジダ症：1 日 1 回 50mg を点滴静注する。重症又は難治性カンジダ症には症状に応じて増量できるが、1 日 300mg を上限とする。

【副】好中球減少、アナフィラキシー様症状 AST・ALT・Al-P・LDH・ γ -GTP 上昇、K 上昇・低下、好酸球増多、発疹、高血圧、動悸、下痢、軟便、BUN・クレアチニン上昇、クレアチニンクリアランス低下、静脈炎、関節炎、血管痛、悪寒、頭痛、CK・ミオグロビン上昇、高ビリルビン血症、低マグネシウム血症、低カルシウム血症、高クロール血症、低カリウム血症、低蛋白血症、低ナトリウム血症、白血球・血小板減少、貧血、血管拡張、嘔吐、嘔気、食欲不振、発熱、腹痛、無力症、寒気、疼痛

【妊】未確立、有益のみ

【授】回避、やむを得ない場合は授乳回避

【小】未確立

【貯】遮光

【商】フルカリック Fulcaliq 田辺

注射：液剤

1 号：大室 700mL、中室 200mL、小室 3mL

2 号：大室 700mL、中室 300mL、小室 3mL

【警】ビタミン B₁ 欠乏症と思われる重篤なアシドーシスが発現した場合には、直ちに 100～400mg のビタミン B₁ 製剤を急速静脈内投与すること。また、高カロリー輸液療法を施行中の患者では、基礎疾患及び合併症に起因するアシドーシスが発現することがあるので、症状があらわれた場合には高カロリー輸液療法を中断し、アルカリ化剤の投与等の処置を行うこと。

【禁】本剤又は本剤配合成分に過敏症の既往歴のある患者、血友病の患者、乳酸血症の患者、高 Na 血症の患者、高 Cl 血症の患者、高 K 血症・乏尿・アジソン病・高窒素血症の患者、高 P 血症・副甲状腺機能低下症の患者、高 Mg 血症・甲状腺機能低下症の患者、高 Ca 血症の患者、肝性昏睡又は肝性昏睡のおそれのある患者、重篤な腎障害のある患者、アミノ酸代謝異常のある患者

【効】経口、経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない場合の水分、電解質、カロリー、アミノ酸及びビタミンの補給

【用】1 号 本剤は経中心静脈栄養療法の開始時で、耐糖能が不明の場合や耐糖能が低下している場合の開始液として、あるいは侵襲時等で耐糖能が低下しており、ブドウ糖を制限する必要がある場合の維持液として用いる。1 日 1,806mL を 24 時間かけて中心静脈内に持続点滴注入する。2 号 本剤は経中心静脈栄養療法の維持液として用いる。1 日 2,006mL を 24 時間かけて中心静脈内に持続点滴注入する。

【副】アシドーシス、ショック、アナフィラキシー様症状、高血糖 発疹、蕁麻疹、高 K 血症、高 Na 血症、尿糖、高尿酸血症、低 K 血症、低 Na 血症、悪心・嘔吐、下痢、腹痛、食欲不振、胸部不快感、動悸、肝機能異常、腎機能障害、脳浮腫、肺水腫、末梢浮腫、水中毒、悪寒、熱感、頭痛、血管痛、高アンモニア血症、顔面潮紅

【妊】未確立、有益のみ 3 ヶ月以内：注意

【授】未確立、回避、やむを得ない場合は授乳回避

【未・新・乳・幼・小】未確立，慎重

【貯】遮光

*塩酸エスマロール Esmolol Hydrochloride

【商】ブレビブロック Brevibloc 丸石

注射：液剤(調) 1瓶 (10mL) 中 100mg

【禁】本剤及び他のβ遮断剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者，糖尿病性ケトアシドーシス・代謝性アシドーシスのある患者，洞性徐脈・房室ブロック（Ⅱ，Ⅲ度）・洞房ブロック・洞不全症候群のある患者，心原性ショックの患者，肺高血圧による右心不全のある患者，うっ血性心不全のある患者，未治療の褐色細胞腫の患者

【効】手術時の上室性頻脈性不整脈に対する緊急処置

【用】1回 1mg/kg を 30 秒間で心電図の連続監視下に静注する。

【副】心不全，末梢性虚血，房室ブロック，気管支痙攣，呼吸困難，喘鳴，痙攣発作，血栓性静脈炎，肺水腫 低血圧，ST 低下，徐脈，心室性期外収縮，蒼白，潮紅，胸痛，失神，味覚障害，めまい，傾眠，錯乱，頭痛，激越，感覚障害，抑うつ，思考異常，不安，ふらつき感，言語障害，鼻閉，ラ音，悪心，嘔吐，消化不良，食欲不振，便秘，口渇，腹痛，血管外漏出による皮膚壊死，炎症・硬結，浮腫，紅斑，皮膚変色，灼熱感，疲労，尿閉，視覚異常，骨痛，悪寒，発熱，無力症

【妊】有益のみ

【授】回避，やむを得ない場合は授乳回避

【未・新・乳・幼・小】未確立

*フェルカルボトラン Ferucarbotran

【商】リゾビスト Resovist シェーリング

注射：液剤 1瓶 (1.6mL) 中鉄として 44.6mg

【禁】本剤の成分又は鉄注射剤に対し過敏症の既往歴のある患者，一般状態の極度に悪い患者，ヘモクロマトーシス等鉄過剰症の患者，出血している患者

【効】磁気共鳴コンピューター断層撮影における肝腫瘍の局在診断のための肝臓造影

【用】0.016mL/kg（鉄として 0.45mg/kg = 8μmol/kg）を静注する。投与量は 1.4mL までとする。過剰量の投与あるいは追加投与はしないこと。

【副】アナフィラキシー様症状 ショック 発疹，蕁麻疹，発赤，癢痒感，嘔気，後頭部痛，灼熱感，頭痛，手・下肢のしびれ，冷汗，血圧上昇，虚脱，鼻出血，熱感，倦怠感，腰痛，背部痛，胸膜刺激症状，発熱

【妊】有益のみ

【授】回避，やむを得ない場合は授乳中止

【未・新・乳・幼・小】未確立