

DRUG

INFORMATION

2003 No. 22

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室（内線 2834）

平成 15 年 9 月 5 日発行

オブソ内服液 5mg（塩酸モルヒネ内用液剤）の使用について

今回の薬事委員会で、癌疼痛用内服液剤のオブソ内服液 5mg（塩酸モルヒネ内用液剤，1包 5mg/2.5mL）が採用になりました。ついては、オブソ内服液を処方および施用する際は以下の点を厳守して下さい。また、貴下職員に周知徹底願います。

なお、不明な点等がある場合は薬剤部麻薬係（担当者：各務，内線：2829）へ問い合わせして下さい。

記

- 1．オブソ内服液 5mg の処方は，1 回量が 5mg の整数倍になる場合のみに限りま
す。それ以外は，塩酸モルヒネ水（10mg/mL）を処方して下さい。
- 2．処方オーダー後，投与量の変更が生じたことによって1回の服用量が5mgの整
数倍にならない場合は，残薬は全て薬剤部注射薬管理室へ返却し，塩酸モルヒ
ネ水（10mg/mL）を再処方して下さい。
- 3．万が一，開封後残液が生じた場合は，こぼさないようにシリンジ等に保管し速
やかに薬剤部注射薬管理室へ返却して下さい。

以上