

DRUG

INFORMATION

2004 No. 10

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室（内線7083）

平成16年5月26日発行

目 次

麻薬処方の運用について

Drug Information は医学部ホームページの下記アドレスにて提供しています。

<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/index.htm>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。

yaku@cc.gifu-u.ac.jp

麻薬処方の運用について

5 月 25 日の薬事委員会において、医療情報部およびシステム開発担当を含めた協議の結果、電子カルテシステムの不備により入院の麻薬処方の施用記録に不具合が生じるため、入院の麻薬処方に限り以下のように運用が変更されることとなりました。該当薬剤の処方時にはご注意願います。

- 1 処方箋内には 1 種類の麻薬のみ処方して下さい。
- 2 種類以上の麻薬を処方する場合には、処方箋を別にして処方して下さい。

例 1)

「デュロテップパッチ」と 「オプソ内服液」を 併用する場合	処方 1
	Rp.1 デュロテップパッチ 2.5mg 1 枚 1 日 1 回 2 日分
	+
	処方 2
	Rp.1 オプソ内服液 5mg 1 包 疼痛時 10 回分

例 2)

「MS コンチン」の 規格の異なる 2 剤を 併用する場合	処方 1
	Rp.1 MS コンチン錠 60mg 2 錠 1 日 2 回朝夕食後 7 日分
	+
	処方 2
	Rp.1 MS コンチン錠 10mg 4 錠 1 日 2 回朝夕食後 7 日分

ただし，麻薬と他の併用薬を同時に処方する場合は，同一処方も可能です。

例 3)

「MS コンチン」と 「コンスタン」と 「リスミー」を 併用する場合	処方 1
	Rp.1 MS コンチン錠 60mg 2 錠 1 日 2 回朝夕食後 7 日分
	Rp.2 コンスタン 0.4mg 錠 1 錠 1 日 1 回朝食後 7 日分
	Rp.3 リスミー錠 1mg 1 錠 不眠時 3 回分

なお，外来の麻薬処方および注射の麻薬処方については，従来どおり同一処方でも可能とします。

今回の運用の変更は，麻薬の施用記録を電子カルテに記録するためのシステムの制約上，やむを得ず実施するものであり，システムの改良により複数の麻薬の施用記録が可能となった後には再度運用を変更する予定です。