

DRUG

INFORMATION



2007 No. 15

平成19年6月8日発行

1. 医薬品の採用・中止・変更について 1
—平成19年6月7日 薬事委員会結果報告—
2. 新規医薬品添付文書情報 3

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/web/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp

医薬品の採用・中止・変更について

ー平成 19 年 6 月 7 日 薬事委員会結果報告ー

新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
コペガス錠(リバビリン)	200mg/錠	抗ウイルス剤	中外
バルトレックス顆粒(塩酸バラシクロビル)	500mg/g	抗ウイルス剤	GSK
ビオスリー錠(ラクトミン、酪酸菌、糖化菌)	合剤	活性生菌製剤	東亜新薬
ボナロン錠(アレンドロン酸ナトリウム水和物)	35mg/錠	骨粗鬆症治療剤	帝人
アリムタ注射用(ペメトレキセドナトリウム水和物)	500mg/V	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	イーライリリー
フィシザルツ-PL	2,000mL/袋	生理食塩液	扶桑
フォリスチム注(フォリトロピンベータ)	75 国際単位/0.5mL/V	遺伝子組換え卵胞刺激ホルモン製剤	オルガノン
リン酸 2 カリウム注シリンジ(リン酸二カリウム)	20mEq/20mL/筒	電解質補正用剤	テルモ
ローヘパ注シリンジ(パルナパリンナトリウム)	〔200 単位/mL〕 20mL/筒	血液凝固阻止剤	味の素 P

採用医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
オキノーム散(オキシコドン塩酸塩水和物)	5mg/1g/包	癌疼痛治療用散剤	塩野義
ガナトン錠(塩酸イトプリド)	50mg/錠	消化管運動賦活剤	アボット
ゼローダ錠(カペシタビン)	300mg/錠	抗悪性腫瘍剤	中外
パシーフカプセル(塩酸モルヒネ)	30mg/Cp、120mg/Cp	持続性癌疼痛治療剤	武田
プレミント錠(ロサルタンカリウム、ヒドロクロチアジド)	50mg、12.5mg/錠	持続性 ARB/利尿薬合剤	万有
ガチフロ点眼液(ガチフロキサシン水和物)	〔0.3%〕 5mL/本	広範囲抗菌点眼剤	千寿
ゼスタッククリーム(合剤)	25g/本	経皮複合消炎剤	三笠
パルミコート吸入液(ブデソニド)	0.25mg/2mL/本	吸入ステロイド喘息治療剤	アストラゼネカ
ヒルドイドローション(ヘパリン類似物質)	25g/本	血行促進・皮膚保湿剤	マルホ
アムビゾーム点滴静注用(アムホテリシン B)	50mg/V	抗真菌性抗生物質製剤	大日本住友
AKーソリタ・DL(合剤)	A 剤:9L、B 剤:11.5L	人工腎臓用透析液	味の素 P
オプチレイ 240 シリンジ(イオバルソール)	〔240mgI/mL〕 100mL/筒	非イオン性造影剤	タイコ
カイトリル点滴静注用バッグ(塩酸グラニセトロン)	3mg/100mL/袋	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤	中外
ヒューマカート R 注、N 注(キット)(ヒトインスリン)	300 単位/3mL/筒	抗糖尿病剤	イーライリリー
ヒューマログ注キット(インスリンリスプロ)	300 単位/3mL/筒	抗糖尿病剤	イーライリリー
マグセント注(硫酸マグネシウム、ブドウ糖)	100mL/V	切迫早産における子宮収縮抑制剤	東亜新薬

採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
ポンタール散(メフェナム酸)	500mg/g	鎮痛・消炎・解熱剤	第一三共
ヨクイニンエキス散	2g/包	生薬製剤	小太郎
硫酸アトロピン末(アトロピン硫酸塩水和物)	原末	抗コリン剤	メルク
レニベース錠(マレイン酸エナラプリル)	2.5mg/錠	ACE 阻害剤	万有
トラジロール注(アプロチニン)	5 万単位/5mL/A	蛋白分解酵素阻害剤	バイエル
リンデロン懸濁注(ベタメタゾン酢酸エステル、等)	0.5mL/A	副腎皮質ホルモン剤	塩野義

※院内在庫がなくなり次第、処方中止とします。

規格変更医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
キシロカイン液「4%」(塩酸リドカイン)	[4%] 100mL/本 ⇒ 20mL/本	表面麻酔剤	アストラゼネカ

※100mL 製品の在庫がなくなり次第、処方変更とします。

院外採用医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
桂枝茯苓丸料エキス錠	6 錠/包	漢方製剤	カネボウ
コニール錠(ベニジピン塩酸塩)	8mg/錠	高血圧症・狭心症治療剤	協和醗酵
コムタン錠(エンタカボン)	100mg/錠	末梢 COMT 阻害剤	ノバルティス
シナロング錠(シルニジピン)	10mg/錠	持続性 Ca 拮抗降圧剤	キッセイ
ネドリール錠(塩酸テルビナフィン)	125mg/錠	アリルアミン系経口抗真菌剤	マルホ
リーマス錠(炭酸リチウム)	100mg/錠	躁病・躁状態治療剤	大正富山
ランタス注カート(インスリングルルギン)	300 単位/3mL/筒	持効型溶解インスリンアナログ製剤	サノフィ・A

販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	規格・単位	薬品分類	会社名
乾燥ジフテリア抗毒素「チバ」(乾燥ジフテリアウマ抗毒素)	5,000 単位/V	抗毒素類	千葉血清
ヒュメゴン(下垂体性性腺刺激ホルモン)	75I.U./V、100I.U./V	下垂体性性腺刺激ホルモン製剤	オルガノン

※院内在庫がなくなり次第、処方中止とします。

＊リバビリン Ribavirin

【商】コペガス Copegus 中外
内用：錠剤(丸) 1錠中 200mg [806.2 円/錠]

【効】ペグインターフェロンアルファ-2a との併用による以下のいずれかの C 型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善：セログループ 1(ジェノタイプ I (1a)又はⅡ (1b))で HCV-RNA 量が高値の患者、インターフェロン単独療法で無効又はインターフェロン単独療法後再燃した患者

【用】○60kg 以下：1 日 600mg(朝食後 200mg、夕食後 400mg) ○60kg を超え 80kg 以下：1 日 800mg(朝食後 400mg、夕食後 400mg) ○80kg を超える：1 日 1,000mg(朝食後 400mg、夕食後 600mg)

【警】◆本剤では催奇形性が報告されているので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないこと。◆本剤では催奇形性及び精巢・精子の形態変化等が報告されているので、妊娠する可能性のある女性患者及びパートナーが妊娠する可能性のある男性患者に投与する場合には、避妊をさせること。◆本剤では精液中への移行が否定できないことから、パートナーが妊婦の男性患者に投与する場合には、「使用上の注意」を厳守すること。

【禁】妊婦、妊娠している可能性のある婦人又は授乳中の婦人、本剤の成分又は他のヌクレオシドアナログ(アシクロビル、ガンシクロビル、ビダラビン等)に対し過敏症の既往歴のある患者、コントロールの困難な心疾患(心筋梗塞、心不全、不整脈等)のある患者、異常ヘモグロビン症(サラセミア、鎌状赤血球性貧血等)の患者、慢性腎不全又はクレアチニンクリアランスが 50mL/分以下の腎機能障害のある患者、重度のうつ病・自殺念慮又は自殺企図等の重度の精神病状態にある患者又はその既往歴のある患者、重度の肝機能障害のある患者、自己免疫性肝炎の患者

【副】貧血、汎血球減少、無顆粒球症、白血球・血小板減少、血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿毒症症候群、再生不良性貧血、間質性肺炎、肺浸潤、呼吸困難、うつ病、自殺念慮、自殺企図、肝炎の増悪、肝機能障害、自己免疫現象、心筋症、心不全、狭心症、不整脈、心筋

梗塞、心内膜炎、心膜炎、敗血症、脳出血、脳梗塞、肺塞栓症、意識障害、痙攣、てんかん発作、見当識障害、昏睡、譫妄、錯乱、幻覚、痴呆様症状、糖尿病、甲状腺機能異常、乾癬、急性腎不全、ネフローゼ症候群、消化管出血、消化性潰瘍、虚血性大腸炎、ショック、網膜症
①発熱、倦怠感、頭痛、関節痛、筋痛、悪寒、脱力 ②食欲減退、腹痛、下痢・軟便、嘔気、腹部不快感、便秘、嘔吐、口内炎及び口腔内潰瘍形成、味覚異常、腹部膨満、歯肉出血、歯痛、胃炎、消化不良、口渇、舌痛、口内乾燥、舌炎、腭炎、嚥下障害 ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏㢐㢑㢒㢓㢔㢕㢖㢗㢘㢙㢚㢛㢜㢝㢞㢟㢠㢡㢢㢣㢤㢥㢦㢧㢨㢩㢪㢫㢬㢭㢮㢯㢰㢱㢲㢳㢴㢵㢶㢷㢸㢹㢺㢻㢼㢽㢾㢿㣀㣁㣂㣃㣄㣅㣆㣇㣈㣉㣊㣋㣌㣍㣎㣏㣐㣑㣒㣓㣔㣕㣖㣗㣘㣙㣚㣛㣜㣝㣞㣟㣠㣡㣢㣣㣤㣥㣦㣧㣨㣩㣪㣫㣬㣭㣮㣯㣰㣱㣲㣳㣴㣵㣶㣷㣸㣹㣺㣻㣼㣽㣾㣿㤀㤁㤂㤃㤄㤅㤆㤇㤈㤉㤊㤋㤌㤍㤎㤏㤐㤑㤒㤓㤔㤕㤖㤗㤘㤙㤚㤛㤜㤝㤞㤟㤠㤡㤢㤣㤤㤥㤦㤧㤨㤩㤪㤫㤬㤭㤮㤯㤰㤱㤲㤳㤴㤵㤶㤷㤸㤹㤺㤻㤼㤽㤾㤿㥀㥁㥂㥃㥄㥅㥆㥇㥈㥉㥊㥋㥌㥍㥎㥏㥐㥑㥒㥓㥔㥕㥖㥗㥘㥙㥚㥛㥜㥝㥞㥟㥠㥡㥢㥣㥤㥥㥦㥧㥨㥩㥪㥫㥬㥭㥮㥯㥰㥱㥲㥳㥴㥵㥶㥷㥸㥹㥺㥻㥼㥽㥾㥿㦀㦁㦂㦃㦄㦅㦆㦇㦈㦉㦊㦋㦌㦍㦎㦏㦐㦑㦒㦓㦔㦕㦖㦗㦘㦙㦚㦛㦜㦝㦞㦟㦠㦡㦢㦣㦤㦥㦦㦧㦨㦩㦪㦫㦬㦭㦮㦯㦰㦱㦲㦳㦴㦵㦶㦷㦸㦹㦺㦻㦼㦽㦾㦿㧀㧁㧂㧃㧄㧅㧆㧇㧈㧉㧊㧋㧌㧍㧎㧏㧐㧑㧒㧓㧔㧕㧖㧗㧘㧙㧚㧛㧜㧝㧞㧟㧠㧡㧢㧣㧤㧥㧦㧧㧨㧩㧪㧫㧬㧭㧮㧯㧰㧱㧲㧳㧴㧵㧶㧷㧸㧹㧺㧻㧼㧽㧾㧿㨀㨁㨂㨃㨄㨅㨆㨇㨈㨉㨊㨋㨌㨍㨎㨏㨐㨑㨒㨓㨔㨕㨖㨗㨘㨙㨚㨛㨜㨝㨞㨟㨠㨡㨢㨣㨤㨥㨦㨧㨨㨩㨪㨫㨬㨭㨮㨯㨰㨱㨲㨳㨴㨵㨶㨷㨸㨹㨺㨻㨼㨽㨾㨿㩀㩁㩂㩃㩄㩅㩆㩇㩈㩉㩊㩋㩌㩍㩎㩏㩐㩑㩒㩓㩔㩕㩖㩗㩘㩙㩚㩛㩜㩝㩞㩟㩠㩡㩢㩣㩤㩥㩦㩧㩨㩩㩪㩫㩬㩭㩮㩯㩰㩱㩲㩳㩴㩵㩶㩷㩸㩹㩺㩻㩼㩽㩾㩿㪀㪁㪂㪃㪄㪅㪆㪇㪈㪉㪊㪋㪌㪍㪎㪏㪐㪑㪒㪓㪔㪕㪖㪗㪘㪙㪚㪛㪜㪝㪞㪟㪠㪡㪢㪣㪤㪥㪦㪧㪨㪩㪪㪫㪬㪭㪮㪯㪰㪱㪲㪳㪴㪵㪶㪷㪸㪹㪺㪻㪼㪽㪾㪿㫀㫁㫂㫃㫄㫅㫆㫇㫈㫉㫊㫋㫌㫍㫎㫏㫐㫑㫒㫓㫔㫕㫖㫗㫘㫙㫚㫛㫜㫝㫞㫟㫠㫡㫢㫣㫤㫥㫦㫧㫨㫩㫪㫫㫬㫭㫮㫯㫰㫱㫲㫳㫴㫵㫶㫷㫸㫹㫺㫻㫼㫽㫾㫿㬀㬁㬂㬃㬄㬅㬆㬇㬈㬉㬊㬋㬌㬍㬎㬏㬐㬑㬒㬓㬔㬕㬖㬗㬘㬙㬚㬛㬜㬝㬞㬟㬠㬡㬢㬣㬤㬥㬦㬧㬨㬩㬪㬫㬬㬭㬮㬯㬰㬱㬲㬳㬴㬵㬶㬷㬸㬹㬺㬻㬼㬽㬾㬿㭀㭁㭂㭃㭄㭅㭆㭇㭈㭉㭊㭋㭌㭍㭎㭏㭐㭑㭒㭓㭔㭕㭖㭗㭘㭙㭚㭛㭜㭝㭞㭟㭠㭡㭢㭣㭤㭥㭦㭧㭨㭩㭪㭫㭬㭭㭮㭯㭰㭱㭲㭳㭴㭵㭶㭷㭸㭹㭺㭻㭼㭽㭾㭿㮀㮁㮂㮃㮄㮅㮆㮇㮈㮉㮊㮋㮌㮍㮎㮏㮐㮑㮒㮓㮔㮕㮖㮗㮘㮙㮚㮛㮜㮝㮞㮟㮠㮡㮢㮣㮤㮥㮦㮧㮨㮩㮪㮫㮬㮭㮮㮯㮰㮱㮲㮳㮴㮵㮶㮷㮸㮹㮺㮻㮼㮽㮾㮿㯀㯁㯂㯃㯄㯅㯆㯇㯈㯉㯊㯋㯌㯍㯎㯏㯐㯑㯒㯓㯔㯕㯖㯗㯘㯙㯚㯛㯜㯝㯞㯟㯠㯡㯢㯣㯤㯥㯦㯧㯨㯩㯪㯫㯬㯭㯮㯯㯰㯱㯲㯳㯴㯵㯶㯷㯸㯹㯺㯻㯼㯽㯾㯿㰀㰁㰂㰃㰄㰅㰆㰇㰈㰉㰊㰋㰌㰍㰎㰏㰐㰑㰒㰓㰔㰕㰖㰗㰘㰙㰚㰛㰜㰝㰞㰟㰠㰡㰢㰣㰤㰥㰦㰧㰨㰩㰪㰫㰬㰭㰮㰯㰰㰱㰲㰳㰴㰵㰶㰷㰸㰹㰺㰻㰼㰽㰾㰿㱀㱁㱂㱃㱄㱅㱆㱇㱈㱉㱊㱋㱌㱍㱎㱏㱐㱑㱒㱓㱔㱕㱖㱗㱘㱙㱚㱛㱜㱝㱞㱟㱠㱡㱢㱣㱤㱥㱦㱧㱨㱩㱪㱫㱬㱭㱮㱯㱰㱱㱲㱳㱴㱵㱶㱷㱸㱹㱺㱻㱼㱽㱾㱿㲀㲁㲂㲃㲄㲅㲆㲇㲈㲉㲊㲋㲌㲍㲎㲏㲐㲑㲒㲓㲔㲕㲖㲗㲘㲙㲚㲛㲜㲝㲞㲟㲠㲡㲢㲣㲤㲥㲦㲧㲨㲩㲪㲫㲬㲭㲮㲯㲰㲱㲲㲳㲴㲵㲶㲷㲸㲹㲺㲻㲼㲽㲾㲿㳀㳁㳂㳃㳄㳅㳆㳇㳈㳉㳊㳋㳌㳍㳎㳏㳐㳑㳒㳓㳔㳕㳖㳗㳘㳙㳚㳛㳜㳝㳞㳟㳠㳡㳢㳣㳤㳥㳦㳧㳨㳩㳪㳫㳬㳭㳮㳯㳰㳱㳲㳳㳴㳵㳶㳷㳸㳹㳺㳻㳼㳽㳾㳿㴀㴁㴂㴃㴄㴅㴆㴇㴈㴉㴊㴋㴌㴍㴎㴏㴐㴑㴒㴓㴔㴕㴖㴗㴘㴙㴚㴛㴜㴝㴞㴟㴠㴡㴢㴣㴤㴥㴦㴧㴨㴩㴪㴫㴬㴭㴮㴯㴰㴱㴲㴳㴴㴵㴶㴷㴸㴹㴺㴻㴼㴽㴾㴿㵀㵁㵂㵃㵄㵅㵆㵇㵈㵉㵊㵋㵌㵍㵎㵏㵐㵑㵒㵓㵔㵕㵖㵗㵘㵙㵚㵛㵜㵝㵞㵟㵠㵡㵢㵣㵤㵥㵦㵧㵨㵩㵪㵫㵬㵭㵮㵯㵰㵱㵲㵳㵴㵵㵶㵷㵸㵹㵺㵻㵼㵽㵾㵿㶀㶁㶂㶃㶄㶅㶆㶇㶈㶉㶊㶋㶌㶍㶎㶏㶐㶑㶒㶓㶔㶕㶖㶗㶘㶙㶚㶛㶜㶝㶞㶟㶠㶡㶢㶣㶤㶥㶦㶧㶨㶩㶪㶫㶬㶭㶮㶯㶰㶱㶲㶳㶴㶵㶶㶷㶸㶹㶺㶻㶼㶽㶾㶿㷀㷁㷂㷃㷄㷅㷆㷇㷈㷉㷊㷋㷌㷍㷎㷏㷐㷑㷒㷓㷔㷕㷖㷗㷘㷙㷚㷛㷜㷝㷞㷟㷠㷡㷢㷣㷤㷥㷦㷧㷨㷩㷪㷫㷬㷭㷮㷯㷰㷱㷲㷳㷴㷵㷶㷷㷸㷹㷺㷻㷼㷽㷾㷿㸀㸁㸂㸃㸄㸅㸆㸇㸈㸉㸊㸋㸌㸍㸎㸏㸐㸑㸒㸓㸔㸕㸖㸗㸘㸙㸚㸛㸜㸝㸞㸟㸠㸡㸢㸣㸤㸥㸦㸧㸨㸩㸪㸫㸬㸭㸮㸯㸰㸱㸲㸳㸴㸵㸶㸷㸸㸹㸺㸻㸼㸽㸾㸿㹀㹁㹂㹃㹄㹅㹆㹇㹈㹉㹊㹋㹌㹍㹎㹏㹐㹑㹒㹓㹔㹕㹖㹗㹘㹙㹚㹛㹜㹝㹞㹟㹠㹡㹢㹣㹤㹥㹦㹧㹨㹩㹪㹫㹬㹭㹮㹯㹰㹱㹲㹳㹴㹵㹶㹷㹸㹹㹺㹻㹼㹽㹾㹿㺀㺁㺂㺃㺄㺅㺆㺇㺈㺉㺊㺋㺌㺍㺎㺏㺐㺑㺒㺓㺔㺕㺖㺗㺘㺙㺚㺛㺜㺝㺞㺟㺠㺡㺢㺣㺤㺥㺦㺧㺨㺩㺪㺫㺬㺭㺮㺯㺰㺱㺲㺳㺴㺵㺶㺷㺸㺹㺺㺻㺼㺽㺾㺿㻀㻁㻂㻃㻄㻅㻆㻇㻈㻉㻊㻋㻌㻍㻎㻏㻐㻑㻒㻓㻔㻕㻖㻗㻘㻙㻚㻛㻜㻝㻞㻟㻠㻡㻢㻣㻤㻥㻦㻧㻨㻩㻪㻫㻬㻭㻮㻯㻰㻱㻲㻳㻴㻵㻶㻷㻸㻹㻺㻻㻼㻽㻾㻿㼀㼁㼂㼃㼄㼅㼆㼇㼈㼉㼊㼋㼌㼍㼎㼏㼐㼑㼒㼓㼔㼕㼖㼗㼘㼙㼚㼛㼜㼝㼞㼟㼠㼡㼢㼣㼤㼥㼦㼧㼨㼩㼪㼫㼬㼭㼮㼯㼰㼱㼲㼳㼴㼵㼶㼷㼸㼹㼺㼻㼼㼽㼾㼿㽀㽁㽂㽃㽄㽅㽆㽇㽈㽉㽊㽋㽌㽍㽎㽏㽐㽑㽒㽓㽔㽕㽖㽗㽘㽙㽚㽛㽜㽝㽞㽟㽠㽡㽢㽣㽤㽥㽦㽧㽨㽩㽪㽫㽬㽭㽮㽯㽰㽱㽲㽳㽴㽵㽶㽷㽸㽹㽺㽻㽼㽽㽾㽿㿀㿁㿂㿃㿄㿅㿆㿇㿈㿉㿊㿋㿌㿍㿎㿏㿐㿑㿒㿓㿔㿕㿖㿗㿘㿙㿚㿛㿜㿝㿞㿟㿠㿡㿢㿣㿤㿥㿦㿧㿨㿩㿪㿫㿬㿭㿮㿯㿰㿱㿲㿳㿴㿵㿶㿷㿸㿹㿺㿻㿼㿽㿾㿿

【妊】禁忌 【授】授乳回避

【低・新・乳・幼・小】未確立

＊塩酸バラシクロビル

Valaciclovir Hydrochloride

【商】バルトレックス Valtrex GSK
内用：顆粒剤 1g 中 500mg [599.1 円/g]

【効】①単純疱疹 ②帯状疱疹 ③性器ヘルペスの再発抑制 ④水痘

【用】①成人には 1 回 500mg を 1 日 2 回投与する。②成人には 1 回 1,000mg を 1 日 3 回投与する。③成人には 1 回 500mg を 1 日 1 回投与する。HIV 感染症(CD4 リンパ球数 100/mm³ 以上)には 1 回 500mg を 1 日 2 回投与する。④小児には 1 回 25mg/kg を 1 日 3 回投与する。1 回最高用量は 1,000mg とする。

【禁】本剤の成分あるいはアシクロビルに対し過敏症の既往歴のある患者

【副】アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様症状、汎血球減少、無顆粒球症、血小板減少、DIC、血小板減少性紫斑病、急性腎不全、精神神経症状、Stevens-Johnson 症候群、Lyell 症候群、呼吸抑制、無呼吸、間質性肺炎、肝炎、肝機能障害、黄疸、急性膀胱炎 発疹、蕁麻疹、掻痒、光線過敏症、肝機能検査値上昇、肝炎、下痢、腹痛、嘔気、嘔吐、腹部不快感、頭痛、意識低下、めまい、腎障害

【妊】有益のみ 【授】慎重

【低・新・乳】未確立

【商】ビオスリー Bio-Three 東亜新薬
内用：錠剤 1 錠中ラクトミン 2mg、酪酸菌 10mg、糖化菌 10mg [6.4 円/錠]

【効】腸内菌叢の異常による諸症状の改善

【用】1 日 3～6 錠を 3 回に分割投与する。

【禁】本剤に過敏症の既往歴のある患者、牛乳に対してアレルギーのある患者

【副】アナフィラキシー様症状

＊アレンドロン酸ナトリウム水和物

Alendronate Sodium Hydrate

【商】ボナロン Bonalon 帝人
内用：錠剤(㉔) 1 錠中 35mg [847.8 円/錠]

【効】骨粗鬆症

【用】35mg を 1 週間に 1 回、朝起床時に水約 180mL とともに投与する。服用後少なくとも 30 分は横にならず、飲食(水を除く)並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。

【禁】食道狭窄又はアカラシア(食道弛緩不能症)等の食道通過を遅延させる障害のある患者、30 分以上上体を起こしていることや立っていることのできない患者、本剤の成分あるいは他のビスホスホネート系薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者、低カルシウム血症の患者

【副】食道穿孔、食道狭窄、食道潰瘍、食道炎、食道びらん、口腔内潰瘍、胃・十二指腸潰瘍、出血性胃炎、肝機能障害、黄疸、低カルシウム血症、Stevens-Johnson 症候群、Lyell 症候群、顎骨壊死・顎骨骨髓炎 (消)嘔気、便秘、下痢、胃痛、胃炎、胃不快感、消化不良、口内乾燥、腹痛、嘔吐、食欲不振、腹部膨満感、腹部不快感、口内炎、心窩部痛、胃重感、嚥下困難、胃酸逆流、鼓腸放屁、咽喉頭痛、咽喉頭不快感、おくび (皮)発疹、痒み、脱毛、湿疹、紅斑、蕁麻疹 (血)貧血、白血球数減少、血小板数減少 (肝)AST・ALT・γ-GTP 上昇 (腎)BUN 上昇、頻尿 (中)頭痛、浮動性めまい、回転性めまい、知覚減退 (筋)関節痛、背部痛、筋肉痛、骨痛、筋痙攣 (精)不眠 (電)P 低下、K 上昇 (眠)ぶどう膜炎、眼症状、強膜炎、上強膜炎 (他)LDH・CK 上昇、総コレステロール値上昇、胸痛、倦怠感、味覚倒錯、アルブミン低下、末梢性浮腫、下肢痛、血管浮腫、顔面浮腫、ほてり、動悸、脱力感、発熱、気分不良

【妊】未確立、有益のみ 【授】授乳回避

【小*】未確立

＊ペメトレキセドナトリウム水和物

Pemetrexed Sodium Hydrate

【商】アリムタ Alimta イーライリリー
注射：(㉔) 1 瓶中 500mg [240,649 円/瓶]

【効】悪性胸膜中皮腫

【用】《シスプラチンとの併用》1 日 1 回 500mg /m² を 10 分間かけて点滴静注し、少なくとも 20 日間休薬する。これを 1 コースとし、投与を繰り返す。

【警】◆本剤を含むがん化学療法に際しては、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ投与すること。適応患者の選択にあたっては、各併用薬剤の添付文書を参照して十分注意すること。また、治療開始に先立ち、患者

又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。◆本剤による重篤な副作用の発現を軽減するため、必ず葉酸及びビタミン B₁₂ の投与のもとに本剤を投与すること。◆重度の腎機能障害患者で、本剤に起因したと考えられる死亡が報告されているので、重度の腎機能障害患者には本剤を投与しないことが望ましい。◆多量の胸水又は腹水が認められる患者では、適宜、体腔液を排出すること。◆本剤の投与により、間質性肺炎があらわれることがあるので、本剤の投与に際しては、胸部 X 線検査等を行うなど観察を十分に行い、間質性肺炎が疑われた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

【禁】本剤の成分に対し重篤な過敏症の既往歴のある患者、高度な骨髄抑制のある患者、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

【副】骨髄抑制、間質性肺炎、下痢、脱水、腎不全 ㊟発疹、脱毛、蕁麻疹 ㊿悪心、嘔吐、口内炎・咽頭粘膜炎症、食欲不振、下痢、便秘、消化不良、大腸炎☆ ㊿感覚神経障害、味覚異常、運動神経障害 ㊿不整脈 ㊿結膜炎 ㊿ AST・ALT・γ-GTP 上昇 ㊿疲労、胸痛、発熱、感染

【妊】禁忌 【授】授乳中止

【小*】未確立

*生理食塩液 Isotonic Sodium Chloride Solution

【商】フィシザルツーPL Physisal-z-PL 扶桑
注射：液剤 1 袋(2,000mL)中

塩化ナトリウム 18g [231 円/袋]

【効】①細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クロール欠乏時 ②注射剤の溶解希釈剤 ③皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進 ④医療用器具の洗浄

【用】①20～1,000mL を皮下・静注又は点滴静注する。②適量を取り注射用医薬品の希釈、溶解に用いる。③皮膚、創傷面、粘膜の洗浄、湿布に用いる。含嗽、噴霧吸入に用いる。④医療用器具の洗浄に用いる。

【副】㊿㊿電解質異常、うっ血性心不全、浮腫、アシドーシス

*フォリトロピンベータ Folotropin Beta

【商】フォリスチム Follistim オルガノン

注射：液剤 1 瓶(0.5mL)中 75 国際単位

[3,892 円/瓶]

【効】①複数卵胞発育のための調節卵巣刺激 ②視床下部一下垂体機能障害に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発

【用】①1 日 150 又は 225 国際単位を 4 日間皮下又は筋注する。卵胞の発育程度を観察しながら用量を調整し(通常 75～375 国際単位を 6～12 日間)、平均径 16～20mm の卵胞 3 個以上を超音波断層法により確認した後、胎盤性性腺刺激ホルモン製剤により排卵を誘起する。②1 日 50 国際単位を 7 日間皮下又は筋注する。卵胞の発育程度を観察しながら用量を調整し(卵巣の反応性が低い場合は、原則として、7 日間ごとに 25 国際単位を増量)、平均径 18mm 以上の卵胞を超音波断層法により確認した後、胎盤性性腺刺激ホルモン製剤により排卵を誘起する。

【警】本剤の投与に引き続き、胎盤性性腺刺激ホルモン製剤を投与した場合、血栓塞栓症等に伴う重篤な卵巣過剰刺激症候群があらわれることがある。

【禁】卵巣・乳房・子宮・下垂体又は視床下部に腫瘍のある患者、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人及び授乳婦、診断の確定していない不正出血のある患者、本剤の成分に対し過敏症のある患者、多嚢胞性卵巣症候群に起因しない卵巣嚢胞又は卵巣腫大のある患者

【副】卵巣過剰刺激症候群、血栓塞栓症、流産、子宮外妊娠、多胎妊娠、アレルギー反応 ㊿頭痛 ㊿下腹部痛、嘔気、腹痛 ㊿腹痛(産婦人科系)、卵巣疾患 ㊿疼痛、挫傷、発赤、腫脹、かゆみ ㊿腹部腫脹・膨満

【妊・授】未確立、禁忌

【貯】遮光、2～8℃

＊リン酸二カリウム Dibasic Potassium Phosphate

【商】リン酸 2 カリウム テルモ

注射：液剤 1 シリンジ(20mL) 中 1.74g
(PO_4^{2-} : 20mEq) [後 146 円/筒]

【効】電解質補液の電解質補正

【用】本剤(1mEq/mL 液)を電解質補液の電解質の補正用として、体内の水分、電解質の不足に応じて電解質液に添加して用いる。

【副】テタニー症状、高カリウム血症

＊パルナパリンナトリウム Parnaparin Sodium

【商】ローヘパ Lowhepa 味の素ファルマ

注射：液剤 1 筒(20mL) 中 4,000 単位
[1,454 円/筒]

【効】血液体外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析・血液透析ろ過・血液ろ過)

【用】○出血性病変又は出血傾向を有しない患者の場合：1) 体外循環開始時、治療 1 時間あたり 7～13 単位/kg を体外循環路内血液に単回投与する。2) 体外循環開始時、15～20 単位/kg を体外循環路内血液に単回投与し、体外循環開始後は毎時 6～8 単位/kg を抗凝固薬注入ラインより持続注入する。○出血性病変又は出血傾向を有する患者の場合：体外循環開始時、10～15 単位/kg を体外循環路内血液に単回投与し、体外循環開始後は毎時 6～9 単位/kg を抗凝固薬注入ラインより持続注入する。

【禁】パルナパリンナトリウムに対し過敏症状又は過敏症の既往歴のある患者、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人 高度な出血症状を有する患者、重篤な肝障害又はその既往歴のある患者、ヘパリン起因性血小板減少症(HIT)の既往歴のある患者

【副】血小板減少、ショック★ ④点状出血、貧血、鼻出血 ⑤掻痒感、発疹 ⑥脱毛、白斑、出血性壊死 ⑦AST・ALT・ALP・LDH 上昇 ⑧骨粗鬆症、低アルドステロン症 ⑨胸部圧迫感、両頬のつっぱり感、頭痛、動悸

【妊】未確立、禁忌 【授】授乳回避

【低・新・乳・幼・小】未確立