

DRUG

INFORMATION



2009 No. 26

平成21年11月11日発行

タミフルドライシロップ入手困難時の対応について

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/web/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp

タミフルドライシロップ入手困難時の対応について

新型インフルエンザおよび季節性インフルエンザ患者の急激な増加に伴う薬剤需要量の増加のため、抗インフルエンザウイルス剤「タミフルドライシロップ 3%」の製造メーカーからの供給が追いつかず一時的に供給不安定になることが予測されるとの連絡を受けました（添付資料）。

つきましては、ドライシロップ製剤の入手が困難となった場合の対応として、同一成分薬である「タミフルカプセル 75」の脱カプセル化により調剤を行うことと致します。今後、院内のドライシロップ製剤の在庫がなくなった場合には、薬剤部から疑義照会し、処方の修正を依頼致しますので、下記のとおりカプセル剤を脱カプセル指示（処方オーダー上は粉碎指示）した処方に変更して頂くようお願い致します。

また、院外薬局においても院内と同様の供給体制となるため、院外処方でも同様にカプセル剤への変更が必要となることが予測されます。院外薬局から疑義照会がありました時には随時、院外薬局に対して脱カプセルの指示を頂きますようお願い致します。

【入力例】

オセルタミビルとして 1 日 80mg の処方の場合

変更前

タミフルドライシロップ 30mg/g	80mg
分 2（朝、夕）食後	5 日分



粉碎指示を
お願いします

変更後

(粉) タミフルカプセル 75mg	80mg
分 2（朝、夕）食後	5 日分

注意 !!

タミフルカプセルを脱カプセルした場合、成分であるオセルタミビルは大変苦いので小さな子供に服用させるには工夫が必要です。必要に応じて、ジュースなどに懸濁して服用するよう指導をお願いします。オセルタミビルはチトクローム P450 (CYP) で代謝されないため、ジュース等に懸濁して服用することが可能です。

平成 21 年 11 月

お得意様各位

中外製薬株式会社

タミフルドライシロップ 3 % について

謹啓

時下、益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に対し格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

現在、弊社では、新型インフルエンザによる患者数の増大を勘案した量として、平成 22 年 3 月までに新たに約 1,200 万人分のタミフル製品（タミフルカプセル 75 及びタミフルドライシロップ 3 %）を供給すべく、フル生産体制で臨んでいます。加えて、製品の偏在化等が生じないよう、医薬品卸店各位とも協力の上、適正な流通に努めております。

今般、国内における新型インフルエンザは本格的な流行期となり、特に感染者として 10 歳未満の小児を中心に全国的に拡大し、これらの感染患者はタミフルドライシロップ 3 %の投与対象であることから大幅に需要が増大しています。一方、このタミフルドライシロップ 3 %は、国内生産で月間最大供給能力 50 万人分を確保しているものの、今後、供給可能量を上回る需要が予測されます。

つきましては、タミフルドライシロップ 3 %の入手が困難であり、かつ、医療上その投与が必要と判断される状況におかれましては、タミフルカプセル 75 を脱カプセルしてタミフルドライシロップ 3 %の用法・用量に従い投与していただきたいと存じます。

なお、このことにつきましては、平成 21 年 11 月 6 日付厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡「新型インフルエンザに係るタミフルに関する Q&A について」（別添）にて周知されております。

何卒、ご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

謹白