DRUG INFORMATION

２０１１　Ｎｏ．２７　　平成２３年６月１５日発行

メルビン錠の販売中止に伴い
メトグルコ錠への切替に対応をお願い致します！

岐阜大学医学部附属病院薬剤部
医薬品情報管理室
（内線７０８３）

※　Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
http://www1.med.gifu-u.ac.jp/web/drug-info/

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp（担当：安田）

メルビン錠の販売中止に伴い
メトグルコ錠への切替に対応をお願い致します！

DI ニュース 2011 No.26 の薬事委員会報告にて既に連絡しましたが、経口血糖降下薬「**メルビン錠 250mg**」の販売中止に伴い、同一成分薬の「**メトグルコ錠 250mg**」へ採用を切り替えることと致します。

オーダは、院内処方については在庫がなくなり次第変更しますので、継続投与が必要な場合は再度薬品名から登録をお願いします。院外処方については、院内処方のメルビン錠の中止に合わせてオーダを中止する予定ですが、現時点では両剤が処方できるようになっています。販売メーカーからの情報によると、全国的にメルビン錠の供給が少なくなっており、院外の調剤薬局によっては在庫が十分確保できない店舗もあるため、院内の在庫がなくなる前にメトグルコ錠への切り替えを依頼される場合があるとのことです。調剤薬局から変更依頼があった場合には、メトグルコ錠への変更に対応して頂きますようご協力をお願い致します。

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室（内線 7083）までご連絡下さい。

薬品名	メルビン錠 250mg	メトグルコ錠 250mg
外観		
効能	2 型糖尿病（ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る）：食事療法・運動療法のみ、食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用	2 型糖尿病（ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る）：食事療法・運動療法のみ、食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用
用法	1 日 500mg より開始し、1 日 2～3 回食後に分割投与する。1 日最高投与量は 750mg とする。	1 日 500mg より開始し、1 日 2～3 回に分割して食直前又は食後に投与する。維持量は 1 日 750～1,500mg とする。1 日最高投与量は 2,250mg までとする。
薬価	9.6 円/錠	9.9 円/錠