

DRUG



INFORMATION

2014 No. 18

平成26年6月6日発行

1. 医薬品の採用・中止・変更について 1
(平成26年6月5日 薬事委員会結果報告)
 - ①新規試用医薬品
 - ②採用中止医薬品
 - ③販売中止医薬品

2. 新規採用医薬品情報 2
—新規試用医薬品—

3. 採用医薬品の後発医薬品への切替について 4

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ DrugInformation は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

①新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
イーケプラドライシロップ 50% (レベチラセタム)	抗てんかん剤
カルタン OD 錠 500mg (沈降炭酸カルシウム)	高リン血症治療剤
カロナール細粒 50% (アセトアミノフェン)	解熱鎮痛剤
ザルティア錠 5mg (タダラフィル)	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
テネリア錠 20mg (テネリグリプチン)	選択的 DPP-4 阻害剤
アズルガ配合懸濁性点眼液 (プリンゾラミド、チモロールマレイン酸塩)	炭酸脱水酵素阻害剤 / β 遮断薬配合 緑内障・高眼圧症治療剤
オレンシア点滴静注用 250mg (アバタセプト)	抗リウマチ剤
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g (タルク)	悪性胸水治療剤

⇒ 平成 26 年 6 月 17 日より処方開始の予定です。

②採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アコニンサン錠 (ブシ末)	生薬製剤
ピリナジン末 (アセトアミノフェン)	解熱鎮痛剤 (非ピリン系)
ピレチア細粒 10% (プロメタジン塩酸塩)	抗パーキンソン剤
カタリン点眼用 0.005% (ピレノキシシ)	老人性白内障治療剤
フェナゾールクリーム 5% (ウフェナマート)	抗炎症鎮痛皮膚疾患用剤
ベリプラスト P コンビセット組織接着剤 3mL (配合剤)	生理的組織接着剤
ジプレキサ筋注用 10mg (オランザピン)	抗精神病薬
ブレビブロック注 100mg (エスモロール塩酸塩)	短時間作用型 β_1 遮断剤
リュープリン注射用 1.88 (リュープロレリン酢酸塩)	子宮内膜症治療剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第、処方中止とします。

③販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ゲファニールカプセル 50mg (ゲファルナート)	胃炎・胃・十二指腸潰瘍治療剤

⇒ 院外専用医薬品です。流通在庫がなくなり次第、処方中止とします。

【新規試用医薬品】

(レベチラセタム)

▶イーケプラドライシロップ 50%

E Kepra 500mg/g [大塚]

[薬価]261.2 円/g

【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する抗てんかん薬との併用療法

【用】(内) 成人には1日 1,000mg を1日 2回に分けて投与する。症状により1日 3,000mg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として 1,000mg 以下ずつ行うこと。4歳以上の小児には1日 20mg/kg を1日 2回に分けて投与する。症状により1日 60mg/kg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は2週間以上の間隔をあけて1日用量として 20mg/kg 以下ずつ行うこと。体重 50kg 以上の小児では、成人と同じ用法・用量を用いること。

(沈降炭酸カルシウム)

▶カルタン OD錠 500mg

Caltan 500mg/錠 [ファイザー]

[薬価]6.3 円/錠

【効】保存期及び透析中の慢性腎不全患者

【用】(内) 1日 3g を3回に分割して、食直後、投与する。

(アセトアミノフェン)

▶カロナール細粒 50% ⑥

Caronal 500mg/g [昭和薬品]

[薬価]10.2 円/g

【効】①下記の疾患並びに症状の鎮痛：頭痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、打撲痛、捻挫痛、月経痛、分娩後痛、がんによる疼痛、歯痛、歯科治療後の疼痛、変形性関節症 ②下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む) ③小児科領域における解熱・鎮痛

【用】(内) ①成人には、1回 300~1,000mg を投与し、投与間隔は 4~6 時間以上とする。1日総量として 4,000mg を限度とする。②成人には、1回 300~500mg を頓用する。原則として1日 2回ま

でとし、1日最大 1,500mg を限度とする。③乳児、幼児及び小児には、1回 10~15mg/kg を投与し、投与間隔は 4~6 時間以上とする。1日総量として 60mg/kg を限度とする。成人の用量を超えない。

(タダラフィル)

▶ザルティア錠 5mg

Zalutia 5mg/錠 [日本新薬]

[薬価]230.6 円/錠

【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用】(内)1日 1回 5mg を投与する。

(テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物)

▶テネリア錠 20mg

Tenelia 20mg/錠 [田辺三菱]

[薬価]186.8 円/錠

【効】2型糖尿病

【用】(内) 20mg を1日 1回投与する。効果不十分な場合には、40mg 1日 1回に増量することができる。

▶アゾルガ配合懸濁性点眼液

Azorga (配合剤) 5mL/本 [日本アルコン]

1mL 中：	
ブリンゾラミド	10mg
チモロールマレイン酸塩	5mg

[薬価]450.7 円/mL

【効】次の疾患で他の緑内障治療薬が効果不十分な場合：緑内障、高眼圧症

【用】(外) 1回 1滴、1日 2回点眼する。

(アバタセプト(遺伝子組換え))

▶オレンシア点滴静注用 250mg ⑧

Orencia 250mg/V [小野]

[薬価]54,995 円/瓶

【効】関節リウマチ(既存治療で効果不十分な場合に限る)

【用】(注) 以下の用量を1回の投与量とし点滴静注する。初回投与後、2週、4週に投与し、以後4週間の間隔で投与を行うこと。60kg 未満：500mg、60kg 以上 100kg 以下：750mg、100kg を超える：1g

(タルク)

▶ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g

Unitalc 4g/V [ノーベルファーマ]

[薬価]7,105 円/瓶

【効】悪性胸水の再貯留抑制

【用】(注) 4g を生理食塩液 50mL で懸濁して、胸膜腔内に注入する。

採用医薬品の後発医薬品への切替について

6月5日の薬事委員会にて、次頁に記載した院内採用医薬品について後発医薬品へ切り替えることが承認されました。つきましては、これらの医薬品については6月17日以降、院内の在庫がなくなり次第順次後発医薬品へ切り替えることとします。

院外処方についても、院内の処方が後発医薬品に切り替わると同時にオーダーに追加することと致します。なお、院外処方では従来の先発医薬品の処方も出来るようにしますが、やむを得ない事情(後発医薬品に保険適応がない、患者からの強い要望がある等)を除き後発医薬品への変更不可の指示は避けていただくようご配慮願います。

【オーダーについて】

処方オーダー時の薬品検索では、新規採用の後発医薬品名および旧採用の先発医薬品名のいずれからでも検索出来るように致します(例えば、新たに切替採用となる『スピロラクトン錠 25mg「トーワ」』の場合は、『スピロラクトン』あるいは『アルダクトン A』のいずれでも検索出来るように致します)。ただし、切り替えの際は一定の期間、後発医薬品と先発医薬品の両者が処方時に混在することがあるため、在庫の状況によっては薬剤部から修正を依頼する場合がありますので、ご配慮願います。

後発医薬品への切替品目

院内採用医薬品	(メーカー名)	切替後発医薬品	(メーカー名)
【内用薬】			
アイトロール錠 20mg	トーアエイヨー	一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」	沢井製薬
アルダクトン A 錠 25mg	ファイザー	スピロラクトン錠 25mg 「トーワ」	東和薬品
イミグラン錠 50mg	グラクソ・スミスクライン	スマトリプタン錠 50mg 「F」	富士製薬工業
ウラリットーU 配合散	日本ケミファ	ウリンメット配合散	沢井製薬
オゼックス錠 150mg	大正富山医薬品	トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「タナベ」	田辺製薬販売
カプトリル錠 12.5mg	第一三共エスファ	カプトプリル錠 12.5 「SW」	沢井製薬
カバサル錠 0.25mg	ファイザー	カベルゴリン錠 0.25mg 「タナベ」	田辺製薬販売
キネダック錠 50mg	小野薬品工業	エパルレスタット錠 50 「EK」	エルメッド・エーザイ
グラマリール錠 25mg	アステラス製薬	チアプリド錠 25mg 「サワイ」	沢井製薬
グラマリール細粒 10%	アステラス製薬	チアプリド細粒 10% 「サワイ」	沢井製薬
グルコバイ錠 50mg	富士フィルムファーマ	アカルボース錠 50mg 「ファイザー」	ファイザー
ケフラールカプセル 250mg	塩野義製薬	ケフポリンカプセル 250	沢井製薬
ケフラール細粒小児用 10%	塩野義製薬	ケフポリン細粒 10%	沢井製薬
サアミオン錠 5mg	田辺三菱製薬	ニセルゴリン錠 5mg 「トーワ」	東和薬品
ザイロリック錠 100mg	グラクソ・スミスクライン	アロプリノール錠 100mg 「サワイ」	沢井製薬
シンメトレル錠 50mg	ハルティスファーマ	アマンタジン塩酸塩錠 50mg 「日医工」	日医工
セレクトール錠 100mg	日本新薬	セリプロロール塩酸塩錠 100mg 「日医工」	日医工
セレスタミン配合錠	MSD	セレスターナ配合錠	ファイザー
セロケン錠 20mg	アストラゼネカ	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」	東和薬品
デパス錠 0.5mg	田辺三菱製薬	エチゾラム錠 0.5mg 「アメル」	共和薬品工業
デパス錠 1mg	田辺三菱製薬	エチゾラム錠 1mg 「アメル」	共和薬品工業
テノーミン錠 50mg	アストラゼネカ	アテノロール錠 50mg 「トーワ」	東和薬品
テルネリン錠 1mg	ハルティスファーマ	チザニジン錠 1mg 「日医工」	日医工
ドグマチール錠 50mg	アステラス製薬	スルピリド錠 50mg 「アメル」	共和薬品工業
ドグマチール錠 100mg	アステラス製薬	スルピリド錠 100mg 「アメル」	共和薬品工業
ハイペン錠 200mg	日本新薬	エトドラク錠 200mg 「トーワ」	東和薬品
パナルジン錠 100mg	サノフィ	チクロピジン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」	沢井製薬
ハルシオン 0.25mg 錠	ファイザー	トリアゾラム錠 0.25mg 「EMEC」	エルメッド・エーザイ
PL 配合顆粒	塩野義製薬	セラピナ配合顆粒	ファイザー
プリンペラン錠 5mg	アステラス製薬	エリーテン錠 5mg	高田製薬
フルイトラン錠 2mg	塩野義製薬	トリクロルメチアジド錠 2mg 「NP」	ニプロ
プロサイリン錠 20 μg	科研製薬	ベラプロスト Na 錠 20 μg 「サワイ」	沢井製薬
プロスタール錠 25mg	あすか製薬	プロスタット錠 25mg	日本新薬

後発医薬品への切替品目(つづき)

院内採用医薬品	(メーカー名)	切替後発医薬品	(メーカー名)
ペルサンチン錠 25mg	日本ベーリンガー	ジピリダモール錠 25mg 「トーワ」	東和薬品
ペルサンチン錠 100mg	日本ベーリンガー	ジピリダモール錠 100mg 「トーワ」	東和薬品
ヘルバッサー錠 30mg	田辺三菱製薬	ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg 「日医工」	日医工
ボラキス錠 2mg	サノフィ	オキシブチニン塩酸塩錠 2mg 「日医工」	日医工
ボルタレン錠 25mg	ノバルティスファーマ	ジクロフェナク Na 錠 25mg 「トーワ」	東和薬品
ムコソルバン錠 15mg	帝人ファーマ	アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg 「サワイ」	沢井製薬
ムコダイン錠 500mg	杏林製薬	カルボシステイン錠 500mg 「トーワ」	東和薬品
メイアクト MS 錠 100mg	Meiji Seika ファルマ	セフジトレンピボキシル錠 100mg 「サワイ」	沢井製薬
メトリジン錠 2mg	大正富山医薬品	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「オーハラ」	田辺製薬販売
メリスロン錠 6mg	エーザイ	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「日医工」	日医工
ユリノーム錠 50mg	鳥居薬品	ベンズマロン錠 50mg	杏林製薬
モービック錠 10mg	日本ベーリンガー	メロキシカム錠 10mg 「EMEC」	エルメッドエーザイ
ラミシール錠 125mg	ノバルティスファーマ	ネドリール錠 125mg	マルホ
リーゼ錠 5mg	田辺三菱製薬	クロチアゼパム錠 5mg 「トーワ」	東和薬品
【外用薬】			
アラセナーA 軟膏 3%	持田製薬	カサールクリーム 3%	マルホ
ザジテン点眼液 0.05%	日本アルコン	ケトチフェン点眼液 0.05% 「CH」	日本ジェネリック
ザジテン点鼻液 0.05%	ノバルティスファーマ	ケトチフェン点鼻液 0.05% 「サワイ」	沢井製薬
【注射薬】			
プリンペラン注射液 10mg	アステラス製薬	エリーテン注 10mg/2mL	高田製薬
ラシックス注 20mg	日医工	フロセミド注 20mg 「タイヨー」	テバ製薬