

DRUG

INFORMATION



2014 No. 22

平成26年7月11日発行

院外処方医薬品情報

—平成26年7月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

平成 26 年 7 月 16 日開始薬品

| 医薬品名(成分名) | 薬品分類 |
|---------------------------------|----------------------------------|
| エネーボ配合経腸用液(配合剤) | 蛋白アミノ酸製剤 |
| コンサータ錠 18mg、27mg(メチルフェニデート塩酸塩) | 中枢神経刺激剤 |
| ザクラス配合錠 HD(アジルサルタン、アムロジピンベシル酸塩) | 持続性 AT1 レセプターブロッカー/持続性 Ca 拮抗薬配合剤 |
| タケルダ配合錠(アスピリン、ランソプラゾール) | 抗血栓薬/プロトンポンプ阻害薬配合剤 |
| テノゼット錠 300mg(テノホビルジソプロキシルフマル酸塩) | B 型肝炎治療剤 |
| トラマールカプセル 50mg(トラマドール塩酸塩) | がん疼痛・慢性疼痛治療剤 |

▶エネーボ配合経腸用液

Enevo (配合剤) 250mL/缶 [アボット]

[組成]JUS D.I.参照

[薬価]0.71 円/mL

【効】手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。

【用】(内) 1 日 1,000~1,667mL(1,200~2,000kcal)を経管又は経口投与する。経管投与では本剤を 1 時間に 62.5~104mL(75~125kcal)の速度で持続的又は 1 日数回に分けて投与する。経口摂取可能な場合は 1 日 1 回又は数回に分けて経口投与することもできる。初期量は 333mL/日(400kcal/日)を目安とし、低速度(約 41.7mL/時間(50kcal/時間)以下)で投与する。以後は患者の状態により徐々に増量し標準量とする。投与初期は、水で希釈して投与することも考慮する。

(メチルフェニデート塩酸塩)

▶コンサータ錠 18mg (劇)向

Concerta 18mg/錠 [ヤンセン]

[薬価]337.8 円/錠

▶コンサータ錠 27mg (劇)向

Concerta 27mg/錠

[薬価]374.3 円/錠

【効】注意欠陥/多動性障害(AD/HD)

【用】(内) [18 歳未満] 18mg を初回用量、18~45mg を維持用量として、1 日 1 回朝投与する。増量が必要な場合は、1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 9mg 又は 18mg の増量を行う。1 日用量は 54mg を超えないこと。

[18 歳以上] 18mg を初回用量として、1 日 1 回朝投与する。増量が必要な場合は、1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 9mg 又は 18mg の増量を行う。1 日用量は 72mg を超えないこと。

▶ザクラス配合錠 HD (劇)

Zacras HD (配合剤) [武田]

| | |
|-------------|------|
| 1 錠中： | |
| アジルサルタン | 20mg |
| アムロジピンベシル酸塩 | 5mg |

[薬価]140.6 円/錠

【効】高血圧症

【用】(内) 1 日 1 回 1 錠を投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。

▶タケルダ配合錠

Takelda (配合剤) [武田]

| | |
|----------|-------|
| 1 錠中： | |
| アスピリン | 100mg |
| ランソプラゾール | 15mg |

[薬価]89.3 円/錠

【効】下記疾患又は術後における血栓・塞栓形成の抑制(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限る)：狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞)、冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後

【用】(内) 1 日 1 回 1 錠を投与する。

(テノビルジソプロキシル fumarate)

▶ テノゼット錠 300mg (調)

Tenzo 300mg/錠 〔GSK〕

〔薬価〕996.5 円/錠

【効】B 型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認された B 型慢性肝疾患における B 型肝炎ウイルスの増殖抑制

【用】(内) 1 回 300mg を 1 日 1 回投与する。

(Tramadol hydrochloride)

▶ ترامールカプセル 50mg (調)

Tramal 50mg/Cp 〔ファイザー〕

〔薬価〕67.8 円/Cp

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛：疼痛を伴う各種癌、慢性疼痛

【用】(内) 1 日 100～300mg を 4 回に分割投与する。

1 回 100mg、1 日 400mg を超えないこととする。