

**DRUG**



**INFORMATION**

2014 No. 25

平成26年9月11日発行

院外処方医薬品情報

—平成26年9月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部  
医薬品情報管理室  
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。  
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。  
[di8931@gifu-u.ac.jp](mailto:di8931@gifu-u.ac.jp) (担当：安田)

平成 26 年 9 月 16 日開始薬品

| 医薬品名(成分名)                             | 薬品分類             |
|---------------------------------------|------------------|
| アデムパス錠 0.5mg、1.0mg(リオシグアト)            | 慢性血拴塞栓性肺高血圧症治療剤  |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤(配合剤)                  | 経腸栄養剤            |
| クレナフィン爪外用液 10%(エフィナコナゾール)             | 爪白癬治療剤           |
| ドボベット軟膏(カルシポトリオール、ベタメタゾンジプロピオン酸エステル)  | 尋常性乾癬治療剤         |
| メプチンスイグヘラー10μg 吸入 100回(プロカテロール塩酸塩水和物) | ドライパウダー吸入式気管支拡張剤 |

(リオシグアト)

▶アデムパス錠 0.5mg ㊟

Adempas 0.5mg/錠 〔バイエル〕

〔薬価〕673.4 円/錠

▶アデムパス錠 1.0mg ㊟

Adempas 1mg/錠

〔薬価〕1,346.8 円/錠

【効】外科的治療不適応又は外科的治療後に残存・再発した慢性血拴塞栓性肺高血圧症

【用】(内) 《用量調節期》1回 1.0mg1日3回投与から開始する。2週間継続して収縮期血圧が95mmHg以上で低血圧症状を示さない場合には、2週間間隔で1回用量を0.5mgずつ増量するが、最高用量は1回 2.5mg1日3回までとする。収縮期血圧が95mmHg未満でも低血圧症状を示さない場合は、現行の用量を維持するが、低血圧症状を示す場合には、1回用量を0.5mgずつ減量する。《用量維持期》用量調節期に決定した用量を維持する。用量維持期においても、最高用量は1回 2.5mg1日3回までとし、低血圧症状を示すなど、忍容性がない場合には、1回用量を0.5mgずつ減量する。

▶ラコール NF 配合経腸用半固形剤

Racol NF (配合剤) 300g/袋 〔大塚製薬工場〕

〔組成〕JUS D.I.参照

〔薬価〕0.84 円/g

【効】手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。

【用】(内) 標準量として1日 1,200~2,000g(1,200~2,000kcal)を胃瘻より胃内に1日数回に分けて

投与する。投与時間は100g当たり2~3分(300g当たり6~9分)とし、1回の最大投与量は600gとする。初めて投与する場合は、投与後によく観察を行い臨床症状に注意しながら増量して数日で標準量に達するようにする。

(エフィナコナゾール)

▶クレナフィン爪外用液 10%

Clenafin 3.56g/本 〔科研〕

〔薬価〕1,657.5 円/g

【効】爪白癬

【用】(外) 1日1回罹患爪全体に塗布する。

▶ドボベット軟膏 ㊟

Dovobet (配合剤) 15g/本 〔協和発酵キリン〕

1g中:

カルシポトリオール

50μg

ベタメタゾンジプロピオン酸エステル 0.643mg

〔薬価〕276.4 円/g

【効】尋常性乾癬

【用】(外) 通常、1日1回、患部に適量塗布する。

(プロカテロール塩酸塩水和物)

▶メプチンスイグヘラー10μg 吸入 100回

Meptin 100吸入/キット 〔大塚〕

〔薬価〕1,006.8 円/キット

【効】下記疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解：気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫

【用】(外) 成人1回 20μg(2吸入)、小児1回 10μg(1吸入)を吸入する。