

DRUG



INFORMATION

2014 No. 32

平成26年12月12日発行

1. 医薬品の採用・中止・変更について..... 1

(平成26年12月4日 薬事委員会結果報告)

- ①院内新規試用医薬品
- ②院内採用中止医薬品
- ③院内採用変更医薬品
- ④製剤変更医薬品
- ⑤新規採用ワクチン
- ⑥院外新規採用医薬品
- ⑦院外採用中止医薬品

2. 新規採用医薬品情報..... 3

- 【院内新規試用医薬品】
- 【院内採用変更医薬品】
- 【製剤変更医薬品】
- 【新規採用ワクチン】
- 【院外新規採用医薬品】

3. 同一成分で複数銘柄が採用されている
院外採用医薬品の中止について..... 8

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
イクスタンジカプセル 40mg(エンザルタミド)	前立腺癌治療剤
タペンタ錠 25mg(タペンタドール塩酸塩)	持続性癌疼痛治療剤
ボナロン経口ゼリー35mg(アレンドロン酸ナトリウム水和物)	骨粗鬆症治療剤
アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL(アフリベルセプト)	眼科用 VEGF 阻害剤
エルカルチン FF 静注 1000mg(レボカルニチン)	カルニチン欠乏症治療剤
オイパロミン 300 注 50mL(イオパミドール)	非イオン性造影剤
オイパロミン 300 注 100mL(イオパミドール)	非イオン性造影剤
ミレーナ 52mg(レボノルゲストレル)	子宮内黄体ホルモン放出システム

⇒ 平成 26 年 12 月 16 日より処方開始の予定です。

②院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
コバシル錠 4mg(ペリンドプリルエルブミン)	ACE 阻害剤
膵外分泌機能検査用 PFD 内服液 500mg(ベンチロミド)	膵外分泌機能検査用剤
ボナロン錠 35mg(アレンドロン酸ナトリウム水和物)	骨粗鬆症治療剤
デュロテップ MT パッチ 4.2mg(フェンタニル)	麻薬(非アルカロイド系)
ピバレフリン点眼液 0.04%(ジピペフリン塩酸塩)	緑内障治療剤(交感神経刺激剤)
オムニパーク 300 注 50mL(イオヘキソール)	非イオン性造影剤
オムニパーク 300 注 100mL(イオヘキソール)	非イオン性造影剤
ニドラン注射用 25mg(ニムスチン塩酸塩)	抗癌剤(アルキル化剤)

⇒ 院内の在庫がなくなり次第、処方中止とします。

③院内採用変更医薬品

旧医薬品名⇒新医薬品名	薬品分類
アルファロールカプセル 0.25μg ⇒ ワンアルファ錠 0.25μg	ビタミンD製剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

④製剤変更医薬品

旧医薬品名⇒新医薬品名	(外):院外専用医薬品	薬品分類
フルティフォーム 50 エアゾール 56 吸入用 ⇒ フルティフォーム 50 エアゾール 120 吸入用 ^(外)		喘息治療配合剤
フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用 ⇒ フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用		喘息治療配合剤
レルベア 100 エリプタ 14 吸入用 ⇒ レルベア 100 エリプタ 30 吸入用 ^(外)		喘息治療配合剤
レルベア 200 エリプタ 14 吸入用 ⇒ レルベア 200 エリプタ 30 吸入用		喘息治療配合剤
マスキュラックス静注用 10mg ⇒ マスキュレート静注用 10mg		非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

⑤新規採用ワクチン

医薬品名(成分名)
スクエアキッズ皮下注シリンジ(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン)

⇒ 販売が開始され次第、処方開始の予定です。

⑥院外新規採用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ベルソムラ錠 15mg(スボレキサント)	オレキシン受容体拮抗薬／不眠症治療薬
ベルソムラ錠 20mg(スボレキサント)	オレキシン受容体拮抗薬／不眠症治療薬
リオナ錠 250mg(クエン酸第二鉄水和物)	高リン血症治療剤
アノーロエリプタ7 吸入用 (ウメクリジニウム臭化物、ビランテロールトリフェニル酢酸塩)	COPD 治療配合剤
グラナテック点眼液 0.4%(リパスジル塩酸塩水和物)	Rho キナーゼ阻害薬／緑内障・高眼圧症治療剤
タプコム配合点眼液(タフルプロスト、チモロールマレイン酸塩)	緑内障・高眼圧症治療剤

⇒ 平成 26 年 12 月 16 日より処方開始の予定です。

⑦院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
《全ての包装を中止する医薬品》	
ソメリン錠 10mg(ハロキサゾラム)	催眠・鎮静剤
フルタイド 100 ロタディスク(フルチカゾンプロピオン酸エステル)	喘息治療剤
フルタイド 200 ロタディスク(フルチカゾンプロピオン酸エステル)	喘息治療剤
《一部の包装のみ中止する医薬品》	
イソバイドシロップ 70%(イソソルビド) … 計量包装のみ中止	経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤
ユベラ軟膏(トコフェロール、ビタミン A 油) … 計量包装の中止	外用ビタミン E・A 剤

⇒ 在庫がなくなり次第、処方中止とします。

【院内新規試用医薬品】

(エンザルタミド)

▶イクスタンジカプセル 40mg (劇)

Xtandi 40mg/Cp [アステラス]

[薬価]3,138.8 円/Cp

【効】去勢抵抗性前立腺癌

【用】(内)160mg を 1 日 1 回投与する。

(タペンタドール塩酸塩)

▶タペンタ錠 25mg (麻劇)

Tapenta 25mg/錠 [ヤンセン]

[薬価]108.7 円/錠

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

【用】(内) 1 日 50~400mg を 2 回に分けて投与する。

(アレンドロン酸ナトリウム水和物)

▶ボナロン経口ゼリー35mg (劇)

Bonalon 35mg/2g/包 [帝人]

[薬価]1,262.3 円/包

【効】骨粗鬆症

【用】(内) 35mg を 1 週間に 1 回、朝起床時に水約 180mL とともに投与する。服用後少なくとも 30 分は横にならず、飲食(水を除く)並びに他の薬剤の経口摂取も避けること。

(アフリベルセプト(遺伝子組換え))

▶アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL (劇)

Eylea 2mg/0.05mL/瓶 [バイエル]

[薬価]163,840 円/瓶

【効】①中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ②網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ③病的近視における脈絡膜新生血管 ④糖尿病黄斑浮腫

【用】(注) ①2mg (0.05mL)を 1 ヶ月ごとに 1 回、連続 3 回(導入期)硝子体内投与する。その後の維持期においては、2 ヶ月ごとに 1 回、硝子体内投与する。投与間隔は、1 ヶ月以上あけること。②③1 回あたり 2mg (0.05mL)を硝子体内投与する。投与間隔は、1 ヶ月以上あけること。④2mg (0.05mL)を 1 ヶ月ごとに 1 回、連続 5 回硝

子体内投与する。その後は、2 ヶ月ごとに 1 回、硝子体内投与する。投与間隔は、1 ヶ月以上あけること。

(レボカルニチン)

▶エルカルチン FF 静注 1000mg

L-Cartin FF 1,000mg/5mL/管 [大塚]

[薬価]961 円/管

【効】カルニチン欠乏症

【用】(注) 1 回 50mg/kg を 3~6 時間ごとに、緩徐に静注(2~3 分)又は点滴静注する。1 日の最大投与量は 300mg/kg とする。血液透析に伴うカルニチン欠乏症に対しては、10~20mg/kg を透析終了時に、透析回路静脈側に注入(静注)する。

(イオパミドール)

▶オイパロミン 300 注 50mL (後)

Oypalomin 50mL/V [コニカミノルタ]

[薬価]2,350 円/瓶

▶オイパロミン 300 注 100mL (後)

Oypalomin 100mL/V

[薬価]4,562 円/瓶

【効】①脳血管撮影 ②大動脈撮影 ③選択的血管撮影 ④四肢血管撮影 ⑤デジタル X 線撮影法による静脈性血管撮影 ⑥デジタル X 線撮影法による動脈性血管撮影 ⑦コンピュータ断層撮影における造影 ⑧静脈性尿路撮影 ⑨逆行性尿路撮影

【用】(注) 1 回下記量を使用する。①6~13mL ②30~50mL ③5~40mL ④20~50mL ⑤30~50mL ⑥3~30mL ⑦100mL、高速ラセンコンピュータ断層撮影で肝臓領域の場合:150mL まで可 ⑧40~100mL ⑨5~200mL

(レボノルゲストレル)

▶ミレーナ 52mg

Mirena 52mg/個 [バイエル]

[薬価]26,984.3 円/個

【効】避妊、過多月経、月経困難症

【用】(外) 本剤 1 個を子宮腔内に装着する。

【院内採用変更医薬品】

(アルファカルシドール)

▶ワンアルファ錠 0.25 μ g ㉔

Onealfa 0.25 μ g/錠 〔成人〕

〔薬価〕22.3 円/錠

【効】①下記疾患におけるビタミン D 代謝異常に伴う諸症状(低カルシウム血症、テタニー、骨痛、骨病変等)の改善：(1)慢性腎不全、(2)副甲状腺機能低下症、ビタミン D 抵抗性クル病、骨軟化症 ②骨粗鬆症

【用】(内) 〔成人〕 ①(1)・②1 日 1 回 0.5~1 μ g を投与する。①(2)1 日 1 回 1~4 μ g を投与する。

〔小児〕 ①1 日 1 回 0.05~0.1 μ g/kg を投与する。

②1 日 1 回 0.01~0.03 μ g/kg を投与する。

【製剤変更医薬品】

▶フルティフォーム 50 エアゾール 120 吸入用

Flutiform (配合剤)120 吸入/本 〔杏林〕

1 噴霧中：

フルチカゾンプロピオン酸エステル 50 μ g

ホルモテロールフマル酸塩水和物 5 μ g

〔薬価〕5,780.7 円/瓶

▶フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用

Flutiform (配合剤)120 吸入/本

1 噴霧中：

フルチカゾンプロピオン酸エステル 125 μ g

ホルモテロールフマル酸塩水和物 5 μ g

〔薬価〕6,759.1 円/瓶

【効】気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入 β_2 刺激剤の併用が必要な場合)

【用】(外) 50 エアゾールを 1 回 2 吸入、1 日 2 回投与する。症状に応じて 125 エアゾールを 1 回 2~4 吸入、1 日 2 回投与する。

▶レルベア 100 エリプタ 30 吸入用

Relvar (配合剤)30 ブリスター/個

〔グラクソ・スミスクライン〕

1 ブリスター中：

ビランテロールトリフェニル酢酸塩 40 μ g

フルチカゾンフランカルボン酸エステル 100 μ g

〔薬価〕5,987.2 円/キット

▶レルベア 200 エリプタ 30 吸入用

Relvar (配合剤)30 ブリスター/個

1 ブリスター中：

ビランテロールトリフェニル酢酸塩 40 μ g

フルチカゾンフランカルボン酸エステル 200 μ g

〔薬価〕6,692.6 円/キット

【効】気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入 β_2 刺激剤の併用が必要な場合)

【用】(外) 100 エリプタ 1 吸入を 1 日 1 回吸入投与する。症状に応じて 200 エリプタ 1 吸入を 1 日 1 回吸入投与する。

(ベクロニウム臭化物)

▶マスキュレート静注用 10mg

Ⓢ

Musculate 10mg/V

[富士]

[薬価]554 円/瓶

【効】麻酔時の筋弛緩、気管内挿管時の筋弛緩

【用】(注) 初回量 0.08~0.1mg/kg を静注し、術中必要に応じて 0.02~0.04mg/kg を追加投与する。

【新規採用ワクチン】

(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(ソークワクチン)混合ワクチン)

▶スクエアキッズ皮下注シリンジ

Ⓢ

Squarekids (配合剤) 0.5mL/筒

[ジャパンワクチン]

1 筒中：

百日せき菌の防御抗原	4 単位以上
ジフテリアトキソイド	15Lf 以下
破傷風トキソイド	2.5Lf 以下
不活化ポリオウイルス 1 型	40DU
不活化ポリオウイルス 2 型	8DU
不活化ポリオウイルス 3 型	32DU

【効】百日せき・ジフテリア・破傷風及び急性灰白髄炎の予防

【用】(注) ○初回免疫：小児に、1 回 0.5mL ずつを 3 回、いずれも 3 週間以上の間隔で皮下注する。○追加免疫：小児に、初回免疫後 6 か月以上の間隔をおいて、0.5mL を 1 回皮下注する。

【院外新規採用医薬品】

(スボレキサント)

▶ベルソムラ錠 15mg

Belsomra 15mg/錠 [MSD]

[薬価]89.1 円/錠

▶ベルソムラ錠 20mg

Belsomra 20mg/錠

[薬価]107.9 円/錠

【効】不眠症

【用】(内) 1日1回20mgを、高齢者には1日1回15mgを就寝直前に投与する。

(クエン酸第二鉄水和物)

▶リオナ錠 250mg

Riona 250mg/錠 [鳥居]

[薬価]99.8 円/錠

【効】慢性腎臓病患者における高リン血症の改善

【用】(内) 1回500mgを開始用量とし、1日3回食直後に投与する。最高用量は1日6,000mgとする。

▶アノーロエリプタ7吸入用

Anoro (配合剤)7ブリスター/個

[グラクソ・スミスクライン]

1ブリスター中：

ウメクリジニウム臭化物 62.5μg

ビランテロールトリフェニル酢酸塩 25μg

[薬価]1,997.2 円/キット

【効】慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)

【用】(外)1吸入を1日1回吸入投与する。

(リパスジル塩酸塩水和物)

▶グラナテック点眼液 0.4%

Glanatec 5mL/本 [興和創薬]

[薬価]451 円/mL

【効】次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分又は使用できない場合：緑内障、高眼圧症

【用】(外) 1回1滴、1日2回点眼する。

▶タップコム配合点眼液

Tapcom (配合剤)2.5mL/本

[参天]

1mL中：

タフルプロスト

15μg

チモロールマレイン酸塩

5mg

[薬価]1,060 円/mL

【効】緑内障、高眼圧症

【用】(外)1回1滴、1日1回点眼する。

同一成分で複数銘柄が採用されている院外採用医薬品の中止について

同一成分で複数銘柄が採用されている院外処方医薬品の見直しが行われ、以下の 30 品目（一覧の左列の品目）については過去 1 年間の使用実績等を考慮して中止することとなりました。つきましては、中止医薬品については在庫がなくなり次第、オーダ中止と致します。中止後は DO 処方が出来なくなりますので、用量等にも注意したうえで、切替薬品に変更して再度処方を入力して下さい。

中止医薬品名(成分名)	切替薬品	薬品分類
アルファロールカプセル 0.25μg(アルファカルシドール)	⇒ ワンアルファ錠 0.25μg	ビタミンD製剤
アルファロールカプセル 0.5μg(アルファカルシドール)	⇒ ワンアルファ錠 0.5μg	ビタミンD製剤
アルファロールカプセル 1μg(アルファカルシドール)	⇒ ワンアルファ錠 1μg	ビタミンD製剤
キプレス錠 10mg(モンテルカストナトリウム)	⇒ シングレア錠 10mg	抗アレルギー剤
キプレスチュアブル錠 5mg(モンテルカストナトリウム)	⇒ シングレアチュアブル錠 5mg	抗アレルギー剤
クラリシッド・ドライシロップ 10%小児用(クラリスロマイシン)	⇒ クラリスドライシロップ 10%小児用	マクロライド系抗生物質製剤
コンスタン 0.8mg 錠(アルプラザラム)	⇒ コンスタン 0.4mg 錠	抗不安剤
シンレスタール錠 250mg(プロブコール)	⇒ ロレルコ錠 250mg	高脂血症治療剤
サワシリンカプセル 250mg	⇒ パセトシンカプセル 250mg	ペニシリン系抗生物質製剤
ステーブラ錠 0.1mg(イミダフェナシン)	⇒ ウリトス OD 錠 0.1mg	過活動膀胱治療剤
ゼストリル錠 10mg(リシノプリル水和物)	⇒ ロングス錠 10mg	ACE 阻害剤
ゼスラン錠 3mg(メキタジン)	⇒ ニボラジン錠 3mg	抗アレルギー剤
セパミット-R カプセル 10mg(ニフェジピン)	⇒ アダラート L 錠 10mg	Ca 拮抗剤
ゾラナックス 0.8mg 錠(アルプラザラム)	⇒ ゾラナックス 0.4mg 錠	抗不安剤
トライコア錠 80mg(フェノフィブラート)	⇒ リピディル錠 80mg	フィブラート系製剤
トリノシン顆粒 10%(アデノシン三リン酸二ナトリウム)	⇒ アデホスコークワ顆粒 10%	脳代謝賦活剤
ノイチーム錠 30mg(リゾチーム塩酸塩)	⇒ レフトーゼ錠 30mg	消炎酵素剤
パルギン錠 0.5mg(エチゾラム)	⇒ エチゾラム錠 0.5mg「アメル」、デパス錠 0.5mg	抗不安剤
ヒルナミン細粒 10%(レボメプロマジンマレイン酸塩)	⇒ レボトミン散 10%	抗不安剤
ファステック錠 30mg(ナテグリニド)	⇒ スターシス錠 30mg	速効型食後血糖降下剤
ファステック錠 90mg(ナテグリニド)	⇒ スターシス錠 90mg	速効型食後血糖降下剤
フォサマック錠 5mg(アレンドロン酸ナトリウム水和物)	⇒ ボナロン錠 5mg	ビスホスホネート製剤
プレドニゾン錠「タケダ」5mg(プレドニゾン)	⇒ プレドニン錠 5mg	ステロイド剤
ベネット錠 2.5mg(リセドロン酸ナトリウム水和物)	⇒ アクトネル錠 2.5mg	ビスホスホネート製剤
ホリゾン錠 2mg(ジアゼパム)	⇒ 2mg セルシン錠	抗不安剤
メデット錠 250mg(メトホルミン塩酸塩)	⇒ メトグルコ錠 250mg	ビクアナイド系血糖降下剤
ロプレソール錠 20mg(メプロロール酒石酸塩)	⇒ セロケン錠 20mg	β 遮断剤
インサイドパップ 70mg(インドメタシン)	⇒ イドメシンコーワパップ 70mg	消炎鎮痛パップ剤
カトレップパップ 70mg(インドメタシン)		消炎鎮痛パップ剤
ミルタックスパップ 30mg(ケトプロフェン)		⇒ モーラスパップ 30mg

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室（内線 7083）までご連絡下さい。