

DRUG

INFORMATION



2015 No. 7

平成27年3月12日発行

1. 医薬品の採用・中止・変更について..... 1

(平成27年3月5日 薬事委員会結果報告)

- ①院内新規試用医薬品
- ②院内採用医薬品
- ③院内採用中止医薬品
- ④院内採用変更医薬品
- ⑤製剤変更医薬品
- ⑥販売中止医薬品
- ⑦販売中止ワクチン
- ⑧院外採用中止医薬品

2. 新規採用医薬品情報..... 3

- 【院内新規試用医薬品】
- 【院内採用医薬品】
- 【院内採用変更医薬品】
- 【製剤変更医薬品】

3. 同一成分で複数銘柄が採用されている 院外採用医薬品の中止について..... 6

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

医薬品の採用・中止・変更について ―平成 27 年 3 月 5 日薬事委員会結果報告―

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
レスビア静注・経口液 60mg(無水カフェイン)	未熟児無呼吸発作治療剤
グラナテック点眼液 0.4%(リパスジル塩酸塩水和物)	緑内障・高眼圧症治療剤
ネオキンテープ 73.5mg(オキシブチニン塩酸塩)	過活動膀胱治療剤
カドサイラ点滴静注用 100mg(トラスツズマブエムタンシン)	抗悪性腫瘍剤
カドサイラ点滴静注用 160mg(トラスツズマブエムタンシン)	抗悪性腫瘍剤
大塚生食注 2 ポート 100mL	注入針付生理食塩液
スプレキュア MP 皮下注用 1.8(ブセレリン酢酸塩)	子宮内膜症・子宮筋腫治療剤
ミルセラ注シリンジ 150μg(エポエチンベータペゴル)	エリスロポエチン製剤
メチレンブルー静注 50mg「第一三共」(メチルチオニウム塩化物水和水物)	メトヘモグロビン血症治療剤

⇒ 平成 27 年 3 月 17 日より処方開始の予定です。

②院内採用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ネオレスタール注射液 10mg(クロルフェニラミンマレイン酸塩)	抗ヒスタミン剤

⇒ 平成 27 年 3 月 17 日より処方開始の予定です。

③院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
クラシエ加味帰脾湯エキス錠(配合剤)	漢方製剤
バナン錠 100mg(セフポドキシムプロキセチル)	抗生物質製剤(セフェム系)
プリミドン細粒 99.5%「日医工」(プリミドン)	抗てんかん薬
イムシスト膀胱注用 81mg(BCG・コンノート株)	抗癌剤
デュロテップ MT パッチ 2.1mg(フェンタニル)	麻薬(非アルカロイド系)
ネバナック懸濁性点眼液 0.1%(ネバフェナク)	非ステロイド性抗炎症剤
アブニシオン静注 15mg 3mL(アミノフィリン水和水物)	気管支拡張剤・喘息治療剤(キサンチン誘導体)
アブネカット経口液 10mg(テオフィリン)	気管支拡張剤・喘息治療剤(キサンチン誘導体)
セファメジン α 点滴用キット 1g(セファゾリンナトリウム水和水物)	抗生物質製剤(セフェム系)

⇒ 院内の在庫がなくなり次第、処方中止とします。

④院内採用変更医薬品

旧医薬品名 ⇒ 新医薬品名	薬品分類
セフメタゾンキット点滴静注用 1g ⇒ セフメタゾール Na 静注用 1g「NP」	抗生物質製剤(セフェム系)

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

⑤製剤変更医薬品

旧医薬品名 ⇒ 新医薬品名	(外):院外専用医薬品	薬品分類
トラマールカプセル 25mg ⇒ トラマール OD 錠 25mg		非麻薬性鎮痛剤
トラマールカプセル 50mg ⇒ トラマール OD 錠 50mg ^(外)		非麻薬性鎮痛剤
トレリーフ錠 25mg ⇒ トレリーフ OD 錠 25mg ^(外)		パーキンソン病治療剤
ハスレン軟膏 0.033% ⇒ アズノール軟膏 0.033%		炎症性皮膚疾患治療剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

トラマール OD 錠、トレリーフ OD 錠については、処方箋の薬品名を「～OD 錠(～錠変更可)」と記載し、調剤薬局薬剤師の判断で疑義照会なしで従来の製剤でも調剤ができるように致します。

⑥販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
クロール・トリメトン注 10mg(クロルフェニラミンマレイン酸塩)	抗ヒスタミン剤
フェリコン鉄静注液 50mg(シデフェロン)	鉄剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第、中止とします。

⑦販売中止ワクチン

医薬品名(成分名)
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(配合剤)

⑧院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ボナロン錠 35mg(アレンドロン酸ナトリウム水和物)	骨粗鬆症治療剤

⇒ 院外調剤薬局の在庫状況を判断した上で中止とします。

【院内新規試用医薬品】

(無水カフェイン)

▶レスピア静注・経口液 60mg

Respia 60mg/3mL/V [ノーベルファーマ]

〔薬価〕810 円/瓶

【効】早産・低出生体重児における原発性無呼吸
(未熟児無呼吸発作)

【用】(注) ○初回投与：20mg/kg(1mL/kg)を 30 分
かけて静注する。○維持投与：初回投与から 24
時間後以降に、5mg/kg(0.25mL/kg)を 1 日 1 回、
10 分かけて静注、又は経口投与する。症状に応
じて、10mg/kg(0.5mL/kg)まで増量できる。

(リパスジル塩酸塩水和物)

▶グラナテック点眼液 0.4%

Glanatec 5mL/本 [興和創薬]

〔薬価〕451 円/mL

【効】次の疾患で、他の緑内障治療薬が効果不十分
又は使用できない場合：緑内障、高眼圧症

【用】(外)1 回 1 滴、1 日 2 回点眼する。

(オキシブチニン塩酸塩)

▶ネオキシテープ 73.5mg

Neoxy 73.5mg/枚 [旭化成ファーマ]

〔薬価〕194.8 円/枚

【効】過活動膀胱における尿意切迫感・頻尿及び
切迫性尿失禁

【用】(外) 1 日 1 回、1 枚(73.5mg)を下腹部、腰部
又は大腿部のいずれかに貼付し、24 時間毎に貼
り替える。

(トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え))

▶カドサイラ点滴静注用 100mg (劇)

Kadcyla 100mg/V [中外]

〔薬価〕235,108 円/V

▶カドサイラ点滴静注用 160mg (劇)

Kadcyla 160mg/V

〔薬価〕373,945 円/V

〔貯法〕2～8℃

【効】HER2 陽性の手術不能又は再発乳癌

【用】(注) 1 回 3.6mg/kg を 3 週間間隔で点滴静注
する。

(生理食塩液)

▶大塚生食注 2 ポート 100mL (後)

Isotonic sodium chloride solution 100mL/本

[大塚製薬工場]

〔薬価〕169 円/キット

【効】注射剤の溶解希釈剤

【用】(注) 注射用医薬品の希釈、溶解に用いる。

(ブセレリン酢酸塩)

▶スプレキュア MP 皮下注用 1.8 (劇)

Suprecur MP 1.8mg/0.75mL/筒 [持田]

〔薬価〕30,911 円/筒

【効】○子宮内膜症 ○子宮筋腫の縮小及び子宮
筋腫に基づく下記諸症状の改善：過多月経、下
腹痛、腰痛、貧血

【用】(注) 4 週に 1 回 1.8mg を皮下に投与する。
初回投与は月経周期 1～5 日目に行う。

(エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え))

▶ミルセラ注シリンジ 150μg (劇)

Mircera 150μg/0.3mL/筒 [中外]

〔薬価〕32,219 円/筒

〔貯法〕遮光、2～8℃

【効】腎性貧血

【用】(注) ○血液透析患者：〈初回用量〉1 回
50μg を 2 週に 1 回静注する。〈エリスロポエチン
製剤からの切替え初回用量〉1 回 100μg 又は
150μg を 4 週に 1 回静注する。〈維持用量〉貧血
改善効果が得られたら、1 回 25～250μg を 4 週に
1 回静注する。最高投与量は、1 回 250μg とする。
○腹膜透析患者及び保存期慢性腎臓病患者：〈初
回用量〉1 回 25μg を 2 週に 1 回皮下又は静注す
る。〈エリスロポエチン製剤からの切替え初回用
量〉1 回 100μg 又は 150μg を 4 週に 1 回皮下又は
静注する。〈維持用量〉貧血改善効果が得られた
ら、1 回 25～250μg を 4 週に 1 回皮下又は静注す
る。最高投与量は、1 回 250μg とする。

(メチルチオニウム塩化物水和物)

▶メチレンブルー静注 50mg「第一三共」 (調)

Methylene Blue 50mg/10mL/A [第一三共]

〔薬価〕120,382 円/A

【効】中毒性メトヘモグロビン血症

【用】(注) 生後 3 ヶ月を過ぎた乳幼児、小児及び成人には、1 回 1～2mg/kg を 5 分以上かけて静注する。投与 1 時間以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できるが、累積投与量は最大 7mg/kg までとする。新生児及び生後 3 ヶ月以下の乳児には、1 回 0.3～0.5mg/kg を 5 分以上かけて静注する。投与 1 時間以内に症状が改善しない場合は、必要に応じ、同量を繰り返し投与できる。

【院内採用医薬品】

(クロルフェニラミンマレイン酸塩)

▶ネオレスタール注射液 10mg

Neorestar 10mg/1mL/A [富士]

〔薬価〕92 円/A

【貯法】遮光

【効】蕁麻疹、枯草熱、皮膚疾患に伴う瘙痒(湿疹・皮膚炎、皮膚瘙痒症、薬疹、咬刺症)、アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎

【用】(注) 1 回 5～10mg を 1 日 1～2 回、皮下・筋肉内又は静注する。

【院内採用変更医薬品】

(セフメタゾールナトリウム)

▶セフメタゾール Na 静注用 1g 「NP」 (後)

Cefmetazole Sodium 1g/V [ニプロ]

〔薬価〕286 円/V

【効】敗血症、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎

【用】(注) 成人には 1 日 1～2g を 2 回に分けて静注又は点滴静注する。小児には 1 日 25～100mg/kg を 2～4 回に分けて静注又は点滴静注する。難治性又は重症感染症には、成人では 1 日 4g まで、小児では 1 日 150mg/kg まで増量し、2～4 回に分割投与する。

【製剤変更医薬品】

(トラマドール塩酸塩)

▶トラマール OD 錠 25mg (劇)

Tramal 25mg/錠 [ファイザー]

〔薬価〕38.6 円/錠

▶トラマール OD 錠 50mg (劇)

Tramal 50mg/錠

〔薬価〕67.8 円/錠

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な下記疾患における鎮痛：疼痛を伴う各種癌、慢性疼痛

【用】(内) 1 日 100～300mg を 4 回に分割投与する。1 回 100mg、1 日 400mg を超えないこととする。

(ゾニサミド)

▶トレリーフ OD 錠 25mg (劇)

Trerief 25mg/錠 [大日本住友]

〔薬価〕1,115.9 円/錠

【効】パーキンソン病(レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合)

【用】(内) 本剤は、レボドパ含有製剤と併用する。1 日 1 回 25mg を投与する。パーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off 現象)の改善には、1 日 1 回 50mg を投与する。

(ジメチルイソプロピルアズレン)

▶アズノール軟膏 0.033%

Azunol 500g/個 [日本新薬]

〔薬価〕2.95 円/g

〔貯法〕遮光

【効】湿疹、熱傷・その他の疾患によるびらん及び潰瘍

【用】(外) 適量を 1 日数回塗布する。

同一成分で複数銘柄が採用されている院外採用医薬品の中止について

同一成分で複数銘柄が採用されている院外処方医薬品の見直しが行われ、以下の 18 品目（一覧の左列の品目）については過去 1 年間の使用実績等を考慮して中止することとなりました。つきましては、中止医薬品については在庫がなくなり次第、オーダ中止と致します。中止後は DO 処方が出来なくなりますので、用量等にも注意したうえで、切替薬品に変更して再度処方を入力して下さい。

中止医薬品名(成分名)	切替薬品	薬品分類
トピロリック錠 20mg(トピロキソスタット)	⇒ ウリアデック錠 20mg	高尿酸血症治療剤
トピロリック錠 40mg(トピロキソスタット)	⇒ ウリアデック錠 40mg	高尿酸血症治療剤
サイレース錠 1mg(フルニトラゼパム)	⇒ ロヒプノール錠 1mg	抗不安剤
ロヒプノール錠 2mg(フルニトラゼパム)	⇒ サイレース錠 2mg	抗不安剤
ヒルナミン錠 5mg(レボメプロマジンマレイン酸塩)	⇒ レボトミン錠 5mg	抗精神病剤
レボトミン錠 25mg(レボメプロマジンマレイン酸塩)	⇒ ヒルナミン錠 25mg	抗精神病剤
ニトログリセリン舌下錠 0.3mg「NK」(ニトログリセリン)	⇒ ニトロペン舌下錠 0.3mg	硝酸剤
ブランドル錠 20mg(イソソルビド硝酸塩)	⇒ ニトロール R カプセル 20mg	硝酸剤
ドルナー錠 20μg(ベラプロストナトリウム)	⇒ プロサイリン錠 20μg	プロスタグランジン製剤
ムコサールドライシロップ 1.5%(アンブロキシオール塩酸塩)	⇒ 小児用ムコソルバン DS1.5%	去痰剤
マグミット錠 330mg(酸化マグネシウム)	⇒ マグラックス錠 330mg	緩下剤
ベネット錠 17.5mg(リセドロン酸ナトリウム水和物)	⇒ アクトネル錠 17.5mg	ビスホスネート系骨粗鬆症治療剤
アクトネル錠 75mg(リセドロン酸ナトリウム水和物)	⇒ ベネット錠 75mg	ビスホスネート系骨粗鬆症治療剤
カリエードプラス散 96.7%(ポリスチレンスルホン酸カルシウム)	⇒ カリメート散 5g/包	血清カリウム抑制剤
	⇒ カリメートドライシロップ 92.59% 5.4g/包	血清カリウム抑制剤
	⇒ アーガメイト 89.29%顆粒 5.6g/包	血清カリウム抑制剤
球型吸着炭カプセル 200mg「マイラン」(球形吸着炭)	⇒ クレメジンカプセル 200mg	慢性腎不全用剤
球形吸着炭細粒「マイラン」(球形吸着炭)	⇒ クレメジン細粒分包 2g	慢性腎不全用剤
クラリシッド錠 50mg 小児用(クラリスロマイシン)	⇒ クラリス錠 50mg 小児用	マクロライド系抗生物質製剤
トバルジック軟膏 1% 10g/本(スプロフェン)	⇒ スレンダム軟膏 1% 10g/本	非ステロイド系消炎剤

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室（内線 7083）までご連絡下さい。