

DRUG

INFORMATION



2015 No. 13

平成27年5月8日発行

院外処方医薬品情報

—平成27年5月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：西垣)

平成 27 年 5 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
トリーメク配合錠(ドルテグラビルナトリウム、アバカビル硫酸塩、ラミブジン)	抗ウイルス化学療法剤
ベピオゲル 2.5%(過酸化ベンゾイル)	尋常性ざ瘡治療剤
ノボエイト静注用 2000(ツロクトコグアルファ)	遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤

▶ トリーメク配合錠 (劇)

Triumeq (配合剤) [ヴィーブヘルスケア]

1 錠中：

ドルテグラビルナトリウム	50mg
アバカビル硫酸塩	600mg
ラミブジン	300mg

〔薬価〕7,000.3 円/錠

【効】HIV 感染症

【用】(内) 1 回 1 錠を食事の有無にかかわらず 1 日 1 回投与する。

(過酸化ベンゾイル)

▶ ベピオゲル 2.5%

Bepio 15g/本 [マルホ]

〔薬価〕120.9 円/g

【効】尋常性痤瘡

【用】(外) 1 日 1 回、顔後、患部に適量を塗布する。

(ツロクトコグ アルファ(遺伝子組換え))

▶ ノボエイト静注用 2000

NovoEight 2,000 国際単位/V

[ノボノルディスク]

〔薬価〕147,942 円/瓶

〔貯法〕禁凍結、2～8℃、遮光

【効】血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制

【用】(注) 本剤を添付の溶解液全量で溶解し、1～2mL/分で緩徐に静注する。1 回 10～30 国際単位/kg を投与する。定期的に投与する場合、20～40 国際単位/kg を隔日投与、又は 20～50 国際単位/kg を週 3 回投与し、12 歳未満の小児に対しては 25～50 国際単位/kg を隔日投与、又は 25～60 国際単位/kg を週 3 回投与する。