

DRUG

INFORMATION



2015 No. 29

平成27年8月14日発行

院外処方医薬品情報

—平成27年8月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：西垣)

平成 27 年 8 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ベネシッド錠 250mg(プロベネシド)	痛風治療剤
デュアック配合ゲル(クリンダマイシンリン酸エステル水和物、過酸化ベンゾイル)	尋常性ざ瘡治療配合剤

(プロベネシド)

▶ベネシッド錠 250mg

Benecid 250mg/錠 [科研]

〔薬価〕9.6 円/錠

【効】①痛風 ②ペニシリン・パラアミノサリチル酸の血中濃度維持

【用】(内) ①1 日 0.5～2g を分割投与し、その後維持量として 1 日 1～2g を 2～4 回に分割投与する。

②1 日 1～2g を 4 回に分割投与する。

▶デュアック配合ゲル

Duac (配合剤) 10g/本

〔グラクソ・スミスクライン〕

1g 中：

クリンダマイシンリン酸エステル水和物 10mg

過酸化ベンゾイル 30mg

〔薬価〕157.4 円/g

〔貯法〕2～8℃

【効】尋常性痤瘡

【用】(外) 1 日 1 回、洗顔後、患部に適量を塗布する。