

DRUG



INFORMATION

2015 No. 43

平成27年11月13日発行

院外処方医薬品情報

—平成27年11月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：西垣)

平成 27 年 11 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
カロナール錠 500(アセトアミノフェン)	解熱鎮痛剤
ビオチン・ドライシロップ 0.1%「ホエイ」(ビオチン)	抗皮膚炎ビタミン剤
プラケニル錠 200mg(ヒドロキシクロロキン硫酸塩)	SLE 治療剤

(アセトアミノフェン)

▶カロナール錠 500

⑥

Caronal 500mg/錠

〔昭和薬品〕

〔薬価〕10.3 円/錠

【効】①下記の疾患並びに症状の鎮痛：頭痛、耳痛、症候性神経痛、腰痛症、筋肉痛、打撲痛、捻挫痛、月経痛、分娩後痛、がんによる疼痛、歯痛、歯科治療後の疼痛、変形性関節症 ②下記疾患の解熱・鎮痛：急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む） ③小児科領域における解熱・鎮痛

【用】(内) ①成人には、1 回 300～1,000mg を投与し、投与間隔は 4～6 時間以上とする。1 日総量として 4,000mg を限度とする。②成人には、1 回 300～500mg を頓用する。原則として 1 日 2 回までとし、1 日最大 1,500mg を限度とする。③幼児及び小児には、1 回 10～15mg/kg を投与し、投与間隔は 4～6 時間以上とする。1 日総量として 60mg/kg を限度とする。成人の用量を超えない。

(ビオチン)

▶ビオチン・ドライシロップ 0.1%「ホエイ」⑥

Biotin 1mg/g

〔ファイザー〕

〔薬価〕6.3 円/g

【効】急・慢性湿疹、小児湿疹、接触皮膚炎、脂漏性湿疹、尋常性痤瘡

【用】(内) 1 日 0.5～2mg を 1～3 回に分割投与する。

(ヒドロキシクロロキン硫酸塩)

▶プラケニル錠 200mg

⑥

Plaquenil 200mg/錠

〔サノフィ〕

〔薬価〕418.9 円/錠

【効】皮膚エリテマトーデス、全身性エリテマトーデス

【用】(内) 200mg 又は 400mg を 1 日 1 回食後に投与する。1 日の投与量はブローカ式桂変法により求められる以下の理想体重に基づく用量とする。女性患者の理想体重 (kg)

$$= (\text{身長 (cm)} - 100) \times 0.85$$

男性患者の理想体重 (kg)

$$= (\text{身長 (cm)} - 100) \times 0.9$$

(1)理想体重が 31kg 以上 46kg 未満：1 日 1 回 200mg を投与

(2)理想体重が 46kg 以上 62kg 未満：1 日 1 回 200mg と 1 日 1 回 400mg を 1 日おきに投与

(3)理想体重が 62kg 以上：1 日 1 回 400mg を投与