

DRUG

INFORMATION



2016 No. 12

平成28年3月4日発行

院外処方医薬品情報

—平成28年2月16日開始薬品—

—平成28年3月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

平成 28 年 2 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
オフェブカプセル 100mg(ニンテダニブエタンスルホン酸塩)	チロシンキナーゼ阻害剤／抗線維化剤
オフェブカプセル 150mg(ニンテダニブエタンスルホン酸塩)	チロシンキナーゼ阻害剤／抗線維化剤
パルミコート吸入液 0.5mg(ブデソニド)	吸入ステロイド喘息治療剤
ペンタサ顆粒 94%(メサラジン)	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤
リン酸コデイン錠 5mg「ファイザー」(コデインリン酸塩水和物)	中枢性麻薬性鎮咳剤
アノーロエリプタ30吸入用(ウメクリジニウム臭化物、ビランテロールトリフェニル酢酸塩)	COPD 治療配合剤
ロコアテープ(エスフルルピプロフェン、ハッカ油)	経皮吸収型鎮痛消炎剤
コパキソン皮下注 20mg シリンジ(グラチラマー酢酸塩)	多発性硬化症治療剤

ご案内が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

(ニンテダニブエタンスルホン酸塩)

▶オフェブカプセル 100mg (劇)

Ofev 100mg/Cp [日本ベーリンガー]

[薬価]4,382.9 円/Cp

▶オフェブカプセル 150mg (劇)

Ofev 150mg/Cp

[薬価]6,574.4 円/Cp

[貯法]25℃以下

【効】特発性肺線維症

【用】(内) 1 回 150mg を 1 日 2 回、朝・夕食後に投与する。患者の状態により 1 回 100mg の 1 日 2 回投与へ減量する。

(ブデソニド)

▶パルミコート吸入液 0.5mg

Pulmicort 0.5mg/2mL/管 [アストラゼネカ]

[薬価]341.7 円/管

[貯法]遮光

【効】気管支喘息

【用】(外) 成人には 0.5mg を 1 日 2 回又は 1mg を 1 日 1 回、ネブライザーを用いて吸入投与する。1 日の最高量は 2mg までとする。小児には 0.25mg を 1 日 2 回又は 0.5mg を 1 日 1 回、ネブライザーを用いて吸入投与する。1 日の最高量は 1mg までとする。

(メサラジン)

▶ペンタサ顆粒 94%

Pentasa 943.4mg/g [杏林]

[薬価]164.9 円/g

[貯法]遮光

【効】①潰瘍性大腸炎(重症を除く) ②クローン病

【用】(内) ①成人には 1 日 1,500mg を 3 回に分けて食後投与するが、寛解期には、必要に応じて 1 日 1 回の投与とすることができる。1 日 2,250mg を上限とする。ただし、活動期には、必要に応じて 1 日 4,000mg を 2 回に分けて投与することができる。小児には 1 日 30～60mg/kg を 3 回に分けて食後投与する。1 日 2,250mg を上限とする。②成人には 1 日 1,500mg～3,000mg を 3 回に分けて食後投与する。小児には 1 日 40～60mg/kg を 3 回に分けて食後投与する。

(コデインリン酸塩水和物)

▶リン酸コデイン錠 5mg「ファイザー」

Codeine Phosphate 5mg/錠 [第一三共]

[薬価]10.3 円/錠

【効】各種呼吸器疾患における鎮咳・鎮静、疼痛時における鎮痛、激しい下痢症状の改善

【用】(内)1 回 20mg、1 日 60mg を投与する。

▶アノーロエリプタ 30 吸入用

Anoro (配合剤) 30 プリスター/個
〔グラクソ・スミスクライン〕

〔薬価〕8,324.2 円/キット

1 プリスター中：	
ウメクリジニウム臭化物	62.5μg
ビランテロールトリフェニル酢酸塩	25μg

【効】慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)

【用】(外) 1 吸入を 1 日 1 回吸入投与する。

▶ロコアテープ

〔劇〕

Loqoa (配合剤) 〔大正富山〕

〔薬価〕45.9 円/枚

1 枚(10×14cm)中：	
エスフルルビプロフェン	40mg
ハッカ油	36.2mg

【貯法】遮光

【効】変形性関節症における鎮痛・消炎

【用】(外) 1 日 1 回、患部に貼付する。同時に 2 枚を超えて貼付しないこと。

(グラチラマー酢酸塩)

▶コパキソン皮下注 20mg シリンジ

Copaxone 20mg/1mL/筒 〔武田〕

〔薬価〕5,617 円/筒

【貯法】遮光、禁凍結、2～8℃

【効】多発性硬化症の再発予防

【用】(注) 20mg を 1 日 1 回皮下に投与する。

平成 28 年 3 月 26 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg(プロゲステロン)	天然型黄体ホルモン製剤
ゼビアックスローション 2%(オゼノキサシン)	キノロン系外用抗菌剤

(プロゲステロン)

▶ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg

Utrogestan 200mg/Cp 〔富士〕

【貯法】遮光

【効】生殖補助医療における黄体補充

【用】(外) 1 回 200mg を 1 日 3 回、胚移植 2～7 日前より経腔投与する。妊娠が確認できた場合は、胚移植後 9 週(妊娠 11 週)まで投与を継続する。

(オゼノキサシン)

▶ゼビアックスローション 2%

Zebiax 10g/本 〔マルホ〕

〔薬価〕82.2 円/g

【効】表在性皮膚感染症、瘡瘡(化膿性炎症を伴うもの)

【用】(外) 本剤の適量を 1 日 1 回、患部に塗布する。瘡瘡に対しては洗顔後、患部に塗布する。