

DRUG

INFORMATION



2016 No. 27

平成28年6月6日発行

1. 医薬品の採用・中止・変更について1

(平成28年6月2日 薬事委員会結果報告)

- ①院内新規試用医薬品
- ②院内採用中止医薬品
- ③採用変更医薬品
- ④販売中止医薬品
- ⑤院外採用中止医薬品

2. 新規採用医薬品情報3

【院内新規試用医薬品】

【採用変更医薬品】

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp

医薬品の採用・中止・変更について —平成 28 年 6 月 2 日薬事委員会結果報告—

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ピコスルファート Na 錠 2.5mg「サワイ」	緩下剤
ワントラム錠 100mg(トラマドール塩酸塩)	非麻薬性鎮痛剤
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳下用液 5%「CEO」	耳垢除去剤
メプチン吸入液ユニット 0.3mL 0.01%(プロカテロール塩酸塩水和物)	気管支拡張剤
ハラヴェン静注 1mg(エリブリンメシル酸塩)	抗悪性腫瘍剤
リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	子宮内膜症治療剤

⇒ 平成 28 年 6 月 21 日より処方開始の予定です。

②院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
オゼックス細粒小児用 15%(トスフロキサシントシル酸塩水和物)	化学療法剤(ニューキノロン系)
カレトラ配合錠(ロピナビル、リトナビル)	HIV 感染症治療剤
プロノン錠 150mg(プロパフェノン塩酸塩)	抗不整脈剤
ヘパン ED 配合内用剤(配合剤)	肝不全用栄養剤
アンペック坐剤 20mg(モルヒネ塩酸塩)	麻薬(アヘンアルカロイド)
フォリスチム注 600IU カートリッジ(フォリトロピンベータ)	ゴナドトロピン製剤
リュープリン注射用キット 1.88mg(リュープロレリン酢酸塩)	子宮内膜症治療剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第、処方中止とします。

③採用変更医薬品

旧医薬品名 ⇒ 新医薬品名(会社名)	薬品分類
イムラン錠 50mg(アスペンジャパン) ⇒アザニン錠 50mg(田辺三菱)	免疫抑制剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

④販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	(外):院外専用医薬品	薬品分類
エビプロスタット配合錠 SG(配合剤) ^{(外)*}		前立腺肥大症治療剤
プロヘパール配合錠(配合剤) ^{(外)*}		肝臓加水分解物製剤
エコリシン点眼液(エリスロマイシンラクトビオン酸塩、コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム) ^{**}		抗生物質製剤

⇒ * : 院外調剤薬局の在庫状況を判断した上で中止とします。

** : 旧製剤の在庫がなくなり次第、中止とします。

⑤院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
キックリンカプセル 250mg(ビキサロマー)	高リン血症治療剤
ホスレノールチュアブル錠 250mg(炭酸ランタン水和物)	高リン血症治療剤
ダラシン T ローション 1%(クリンダマイシンリン酸エステル)	外用抗生物質製剤
メプチンスイングヘラー10 μ g 吸入 100 回(プロカテロール塩酸塩)	気管支拡張剤

⇒ 院外調剤薬局の在庫状況を判断した上で中止とします。

【院内新規試用医薬品】

(ピコスルファートナトリウム)

▶ピコスルファート Na 錠 2.5mg「サワイ」 ④

Picosulfate Na 2.5mg/錠 [沢井]

〔薬価〕5.8 円/錠

【効】①各種便秘症 ②術後排便補助、造影剤(硫酸バリウム)投与後の排便促進

【用】(内) ①成人に 1 日 1 回 2～3 錠を投与する。小児には 1 日 1 回 2 錠を投与する。②1 日 1 回 2～3 錠を投与する。

(トラマドール塩酸塩)

▶ワントラム錠 100mg ④

Onetram 100mg/錠 [ファイザー]

〔薬価〕119.1 円/錠

【効】非オピオイド鎮痛剤で治療困難な次記における鎮痛：疼痛を伴う各種癌、慢性疼痛

【用】(内) 100～300mg を 1 日 1 回投与する。1 日 400mg を超えないこととする。

(ジオクチルソジウムスルホサクシネート)

▶ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」 ④

Dioctyl sodium sulfosuccinate otic 10mL/本

[武田]

〔薬価〕54.2 円/mL

【効】耳垢の除去

【用】(外)綿棒等で外耳へ塗布して使用する。除去困難な場合は数滴点耳後 5 分～20 分後に微温湯(37℃)にて洗浄を行う。高度の耳垢栓塞の場合は 1 日 3 回、1～2 日連続点耳後、微温湯(37℃)にて洗浄を行う。

(プロカテロール塩酸塩水和物)

▶メプチン吸入用ユニット 0.3mL 0.01%

Meptin 0.3mL/個 [大塚]

〔薬価〕16.8 円/個

〔貯法〕遮光

【効】①下記疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解：気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫

【用】(外) 成人 1 回 30～50μg(0.3～0.5mL)、小児 1 回 10～30μg(0.1～0.3mL)を深呼吸をしながらネブライザーを用いて吸入する。

(エリブリンメシル酸塩)

▶ハラヴェン静注 1mg ④

Halaven 1mg/V [エーザイ]

〔薬価〕65,901 円/V

【効】手術不能又は再発乳癌、悪性軟部腫瘍

【用】(注) 1 日 1 回 1.4mg/m²を 2～5 分間かけて、週 1 回、静注する。これを 2 週連続で行い、3 週目は休薬する。これを 1 サイクルとして、投与を繰り返す。

(リュープロレリン酢酸塩)

▶リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg 「あすか」 ④

Leuporelin acetate 1.88mg/筒 [あすか]

〔薬価〕19,477 円/筒

【効】①子宮内膜症 ②過多月経・下腹痛・腰痛及び貧血等を伴う子宮筋腫における筋腫核の縮小及び症状の改善 ③中枢性思春期早発症

【用】(注) ①4 週に 1 回 3.75mg を皮下注する。50kg 未満の患者では 1.88mg を投与することができる。初回投与は月経周期 1～5 日目に行う。②4 週に 1 回 1.88mg を皮下注する。体重の重い患者・子宮腫大が高度の患者では 3.75mg を投与する。初回投与は月経周期 1～5 日目に行う。③4 週に 1 回 30μg/kg を皮下注する。180μg/kg まで増量できる。

【採用変更医薬品】

(アザチオプリン)

▶アザニン錠 50mg

Azanin 50mg/錠 [田辺三菱]

〔薬価〕139.9 円/錠

〔貯法〕遮光

【効】①下記の臓器移植における拒絶反応の抑制：

(1)腎移植、(2)肝移植、心移植、肺移植 ②ステロイド依存性のクローン病の緩解導入及び緩解維持並びにステロイド依存性の潰瘍性大腸炎の緩解維持
③治療抵抗性の下記リウマチ性疾患：全身性血管炎（顕微鏡的多発血管炎、ヴェゲナ肉芽腫症、結節性多発動脈炎、Churg-Straus 症候群、大動脈炎症候群等）、全身性エリテマトーデス、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病、及び難治性リウマチ性疾患

【用】(内) ①(1)初期量 1 日 2～3mg/kg、維持量 1 日 0.5～1mg/kg を投与する。(2)初期量 1 日 2～3mg/kg、維持量 1 日 1～2mg/kg を投与する。②1 日 1～2mg/kg (50～10mg)を投与する。③1 日 1～2mg/kg を投与する。1 日 3mg/kg を超えないこと。