

DRUG

INFORMATION



2016 No. 34

平成28年8月19日発行

院外処方医薬品情報

—平成28年8月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp (担当：安田)

平成 28 年 8 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
シクレスト舌下錠 5mg(アセナピンマレイン酸塩)	抗精神病剤
シクレスト舌下錠 10mg(アセナピンマレイン酸塩)	抗精神病剤
ストラテラカプセル 40mg(アトモキセチン塩酸塩)	注意欠陥／多動性障害治療剤
マーデュオックス軟膏(マキサカルシトール、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル)	尋常性乾癬治療剤
アディノベイト静注用 2000 単位(ルリオクトコグアルファ)	ペグ化遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤

ご案内が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

(アセナピンマレイン酸塩)

▶シクレスト舌下錠 5mg (劇)

Sycrest 5mg/錠 [Meiji Seika]

〔薬価〕274 円/錠

▶シクレスト舌下錠 10mg (劇)

Sycrest 10mg/錠

〔薬価〕411 円/錠

【効】総合失調症

【用】(内)1 回 5mg を 1 日 2 回舌下投与から投与を開始する。維持用量は 1 回 5mg を 1 日 2 回、最高用量は 1 回 10mg を 1 日 2 回までとする。

(アトモキセチン塩酸塩)

▶ストラテラカプセル 40mg (劇)

Strattera 40mg/Cp [日本イーライリリー]

〔薬価〕461.2 円/Cp

【効】注意欠陥/多動性障害(AD/HD)

【用】(内)18 歳未満：1 日 0.5mg/kg より開始し、その後 1 日 0.8mg/kg とし、更に 1 日 1.2mg/kg まで増量後、1 日 1.2～1.8mg/kg で維持する。1 日 2 回に分けて投与する。1 日量は 1.8mg/kg 又は 120mg のいずれか少ない量を超えないこと。

18 歳以上：1 日 40mg より開始し、その後 1 日 80mg まで増量後、1 日 80～120mg で維持する。

1 日 1 回又は 2 回に分けて投与する。1 日量は 120mg を超えないこと。

▶マーデュオックス軟膏 (劇)

Marduox (配合剤) [マルホ]

1g 中：

マキサカルシトール 25μg

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス

テル 0.5mg

〔薬価〕231 円/g

【効】尋常性乾癬

【用】(外)1 日 1 回、適量を患部に塗布する。

(ルリオクトコグアルファ)

▶アディノベイト静注用 2000 単位

Adynovate 2000 単位/V [バクスアルタ]

〔薬価〕204,184 円/V

〔貯法〕禁凍結、2～8℃

【効】血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制

【用】(注)添付の溶解液 5mL で溶解し、10mL/分を超えない速度で緩徐に静注する。成人及び 12 歳以上の小児には 1 回 10～30 国際単位/kg を投与する。定期的に投与する場合、1 回 40～50 国際単位/kg を週 2 回投与するが、1 回 60 国際単位/kg に増量できる。