

DRUG



INFORMATION

2016 No. 47

平成28年11月9日発行

院外処方医薬品情報

—平成28年11月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp

平成 28 年 11 月 16 日開始薬品

| 医薬品名(成分名) | 薬品分類 |
|----------------------------|--------------------------|
| ビムパット錠 50mg(ラコサミド) | 抗てんかん剤 |
| ビムパット錠 100mg(ラコサミド) | 抗てんかん剤 |
| ブフェニール錠 500mg(フェニル酪酸ナトリウム) | 尿素サイクル異常症用薬 |
| マリゼブ錠12.5mg(オマリグリプチン) | 持続性選択的 DPP-4 阻害剤/経口糖尿病用剤 |
| マリゼブ錠 25mg(オマリグリプチン) | 持続性選択的 DPP-4 阻害剤/経口糖尿病用剤 |

(ラコサミド)

▶ビムパット錠 50mg

Ⓔ

Vimpat 50mg/錠

[第一三共]

[薬価]215.6 円/錠

▶ビムパット錠 100mg

Ⓔ

Vimpat 100mg/錠

[薬価]352 円/錠

【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する抗てんかん薬との併用療法

【用】(内) 1 日 100mg より投与を開始し、その後 1 週間以上の間隔をあけて増量し、維持用量を 1 日 200mg とするが、いずれも 1 日 2 回に分けて経口投与する。症状により 1 日 400mg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 100mg 以下ずつ行う。

(フェニル酪酸ナトリウム)

▶ブフェニール錠 500mg

Ⓔ

Buphenyl 500mg/錠 [オーファンパシフィック]

[薬価]462.2 円/錠

【効】尿素サイクル異常症

【用】(内) 成人及び 20kg 以上の小児には 1 日あたり 9.9~13.0g/m² を 3~6 回に分割し、食事又は栄養補給とともに若しくは食直後に投与する。20kg 未満の新生児、乳幼児及び小児には 1 日あたり 450~600mg/kg を 3~6 回に分割し、食事又は栄養補給とともに若しくは食直後に投与する。

(オマリグリプチン)

▶マリゼブ錠 12.5mg

Marizev 12.5mg/錠

[MSD]

[薬価]543.3 円/錠

▶マリゼブ錠 25mg

Marizev 25mg/錠

[薬価]1015.3 円/錠

【効】2 型糖尿病

【用】(内) 25mg を 1 週間に 1 回経口投与する。