

DRUG

INFORMATION



2017 No. 1

平成29年1月6日発行

院外処方医薬品情報

- ①新規処方医薬品
- ②製剤変更医薬品

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp

院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

①新規処方医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
エレルサ錠 50mg(エルバスビル)	C 型肝炎治療剤
グラジナ錠 50mg(グラゾプレビル水和物)	C 型肝炎治療剤
ゼンタコートカプセル 3mg(ブデソニド)	クローン病治療剤
プレジコビックス配合錠(ダルナビルエタノール付加物、コビススタット)	HIV 感染症治療剤
リスパダール OD 錠 0.5mg(リスペリドン)	抗精神病剤
ルコナック爪外用液 5%(ルリコナゾール)	爪白癬治療剤
アクトムラ皮下注 162mg シリンジ(トシリズマブ)	関節リウマチ治療剤

⇒ 平成 29 年 1 月 16 日より処方開始の予定です。

②製剤変更医薬品

旧医薬品名 ⇒ 新医薬品名	薬品分類
スピオルトレスピマット 28 吸入 ⇒ スピオルトレスピマット 60 吸入	COPD 治療配合剤

⇒ 調剤薬局の在庫状況から判断して、変更とします。

(エルバスビル)

▶ エレルサ錠 50mg

Erelsa 50mg/錠 [MSD]

[薬価]26,900.5 円/錠

【効】セログループ 1(ジェノタイプ 1)の C 型慢性肝炎又は C 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善

【用】(内) 成人には 50mg を 1 日 1 回投与する。グラゾプレビルと併用し、投与期間は 12 週間とする。

(グラゾプレビル水和物)

▶ グラジナ錠 50mg

Grazyna 50mg/錠 [MSD]

[薬価]9,607.3 円/錠

【効】セログループ 1(ジェノタイプ 1)の C 型慢性肝炎又は C 型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善

【用】(内) 成人には 100mg を 1 日 1 回投与する。エルバスビルと併用し、投与期間は 12 週間とする。

(ブデソニド)

▶ ゼンタコートカプセル 3mg

Zentacort 3mg/Cp [ゼリア]

[薬価]256.9 円/ Cp

【効】軽症から中等症の活動期クローン病

【用】(内) 成人には 9mg を 1 日 1 回朝投与する。

▶ プレジコビックス配合錠

Prezcobix (配合剤) [ヤンセン]

1 錠中：	
ダルナビル	800mg
コビススタット	150mg

[薬価]2,002.8 円/錠

【効】HIV 感染症

【用】(内) 成人には 1 回 1 錠を 1 日 1 回食事中又は食直後に投与する。必ず他の抗 HIV 薬と併用すること。

(リスペリドン)

▶リスパダール OD 錠 0.5mg ㊦

Risperdal 0.5mg/錠 〔ヤンセン〕

〔薬価〕15.5 円/錠

【効】①統合失調症 ②小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性

【用】(内) ①1 回 1mg 1 日 2 回より開始し、徐々に増量する。維持量は 1 日 2~6mg を原則として 1 日 2 回に分けて投与する。1 日量は 12mg を超えないこと。 ②体重 15kg 以上 20kg 未満：1 日 1 回 0.25mg より開始し、4 日目より 1 日 0.5 mg を 1 日 2 回に分けて投与する。増量する場合は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日量として 0.25 mg ずつ増量する。1 日量は 1mg を超えないこと。 体重 20kg 以上：1 日 1 回 0.5mg より開始し、4 日目より 1 日 1mg を 1 日 2 回に分けて投与する。増量する場合は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日量として 0.5 mg ずつ増量する。1 日量は、体重 20kg 以上 45kg 未満の場合は 2.5mg、45kg 以上の場合は 3mg を超えないこと。

(ルリコナゾール)

▶ルコナック爪外用液 5%

Luconac 50mg/g 〔ポーラファルマ〕

〔薬価〕997.8 円/g

【効】皮膚糸状菌(トリコフィトン属)

【用】(外) 1 日 1 回罹患爪全体に塗布する。

(トシリズマブ)

▶アクテムラ皮下注 162mg シリンジ ㊦

Actemra 162mg/筒 〔中外〕

〔薬価〕39,143 円/筒

〔貯法〕2~8℃、遮光

【効】既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）

【用】(注) 成人には 1 回 162mg を 2 週間隔で皮下注射する。

▶スピオルトレスピマツト 60 吸入

Spiolto (配合剤) 60 吸入/本 〔日本ベーリンガー〕

1 噴霧中：

チオトロピウム

2.5μg

オロダテロール

2.5μg

〔薬価〕8,401.2 円/キット

【効】慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β₂刺激剤の併用が必要な場合)

【用】(外) 1 回 2 吸入を 1 日 1 回投与する。