

DRUG

INFORMATION



2017 No. 6

平成29年3月7日発行

院外処方医薬品情報

—平成29年3月16日開始薬品—

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp

院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

平成 29 年 3 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アレセンサカプセル 150mg(アレクチニブ塩酸塩)	抗悪性腫瘍剤(ALK 阻害剤)
リンゼス錠 0.25mg(リナクロチド)	便秘型過敏性腸症候群治療剤
エストラーナテープ 0.09mg(エストラジオール)	経皮吸収エストラジオール製剤
エストラーナテープ 0.18mg(エストラジオール)	経皮吸収エストラジオール製剤
エストラーナテープ 0.36mg(エストラジオール)	経皮吸収エストラジオール製剤
グロウジェクト皮下注 6mg(ソマトロピン)	ヒト成長ホルモン製剤
グロウジェクト皮下注 12mg(ソマトロピン)	ヒト成長ホルモン製剤

(アレクチニブ塩酸塩)

▶アレセンサカプセル 150mg

劇

Alecensa 150mg/Cp

[中外]

[薬価]6,614.6 円/Cp

【効】ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

【用】(内)1 回 300mg を 1 日 2 回投与する。

(リナクロチド)

▶リンゼス錠 0.25mg

Linzess 0.25mg/錠

[アステラス]

[薬価]92.4 円/錠

【効】便秘型過敏性腸症候群

【用】(内)1 回 0.5mg を 1 日 1 回、食前に投与する。

(エストラジオール)

▶エストラーナテープ 0.09mg

Estrana 0.09mg/枚

[久光]

[薬価]41.0 円/枚

▶エストラーナテープ 0.18mg

Estrana 0.18mg/枚

[薬価]58.0 円/枚

▶エストラーナテープ 0.36mg

Estrana 0.36mg/枚

[薬価]78.2 円/枚

【効】①更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う下記症状：血管運動神経症状(Hot flush 及び発汗)、泌尿生殖器の萎縮症状 ②閉経後骨粗鬆症 ③性腺機能低下症、性腺摘出又は原発性卵巣不全による低エストロゲン症

【用】(外) ①②成人に対し 0.72mg を下腹部、臀部のいずれかに貼付し、2 日毎に貼り替える。③成人に対し 0.72mg から開始する。下腹部、臀部のいずれかに貼付し、2 日毎に貼り替え、症状に応じ増減する。小児では、0.09mg から開始する。下腹部、臀部のいずれかに貼付し、2 日毎に貼り替える。その後、0.18mg、0.36mg、0.72mg へ段階的に増量する

(ソマトロピン(遺伝子組換え))

▶グロウジェクト皮下注 6mg

Growject 6mg/1.5mL/筒

[JCR]

[薬価]49,243 円/筒

▶グロウジェクト皮下注 12mg

Growject 12mg/1.5mL/筒

[薬価]98,486 円/筒

[貯法]遮光、2～8℃

【効】①骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症 ②骨端線閉鎖を伴わないターナー症候群における低身長 ③成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る) ④骨端線閉鎖を伴わない SGA (small-for-gestational age) 性低身長症

【用】(注) ①1 週間に 0.175mg/kg を 6～7 回に分けて皮下注する。②1 週間に 0.35mg/kg を 6～7 回に分けて皮下注する。③開始用量として、1 週間に 0.021mg/kg を 6～7 回に分けて皮下注する。1 週間に 0.084mg/kg を上限として漸増し、1 週間に 6～7 回に分けて皮下注する。1 日量として 1mg を超えないこと。④1 週間に 0.23mg/kg を 6

～7 回に分けて皮下注する。効果不十分な場合は
1 週間に 0.47mg/kg まで増量し、6～7 回に分けて
皮下注する。