# DRUG INFORMATION

２０１７　Ｎｏ．９　　平成２９年４月７日発行

## 院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

平成 29 年 4 月 16 日開始薬品

| 医薬品名（成分名） | 薬品分類 |
|---|---|
| アラバ錠 20mg（レフルノミド） | 抗リウマチ剤 |
| イノベロン錠 100mg（ルフィナミド） | 抗てんかん剤 |
| エクメット配合錠 HD（ビルダグリプチン、メトホルミン塩酸塩） | 2 型糖尿病治療剤/DPP-4 阻害薬・BG 系薬配合剤 |
| オテズラ錠 10mg（アプレミラスト） | 乾癬治療剤/PDE4 阻害剤 |
| オテズラ錠 20mg（アプレミラスト） | 乾癬治療剤/PDE4 阻害剤 |
| オテズラ錠 30mg（アプレミラスト） | 乾癬治療剤/PDE4 阻害剤 |
| オプスミット錠 10mg（マシテンタン） | 肺動脈性肺高血圧症治療剤/エンドセリン受容体 |
| ジャカビ錠 5mg（ルキソリチニブリン酸塩） | 抗悪性腫瘍剤/ヤヌスキナーゼ阻害剤 |
| ベムリディ錠 25mg（テノホビルアラフェナミドフマル酸塩） | 抗ウイルス化学療法剤 |
| グラッシュビスタ外用液剤 0.03%5mL（ビマトプロスト） | 睫毛貧毛症用剤/プロスタマイド誘導体 |

（レフルノミド）

**▶アラバ錠 20mg**　劇

Arava　20mg/錠　〔サノフィ〕

**〔薬価〕**309.6 円/錠

**【効】**関節リウマチ

**【用】**（**内**）１日１回 100mg の３日間投与から開始し、その後、維持量として１日１回 20mg を投与する。１日１回 20mg の投与から開始することもできる。維持量は、適宜１日１回 10mg に減量する。

（ルフィナミド）

**▶イノベロン錠 100mg**

Inovelon　100mg/錠　〔エーザイ〕

**〔薬価〕**82 円/錠

**【効】**他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない Lennox-Gastaut 症候群における強直発作及び脱力発作に対する抗てんかん薬との併用療法

**【用】**（**内**）〔4 歳以上の小児〕

・体重 15.0～30.0kg の場合：最初の 2 日間は 1 日 200mg を 1 日 2 回に分けて食後に投与し、その後は 2 日ごとに 1 日用量として 200mg 以下ずつ漸増する。維持用量は 1 日 1,000mg とし、1 日 2 回に分けて食後に投与する。症状により、1 日 1,000mg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は 2 日以上の間隔をあけて 1 日用量として 200mg 以下ずつ行うこと。

・体重 30.1kg 以上の場合：成人の用法・用量に従う。

〔成人〕

最初の 2 日間は 1 日 400mg を 1 日 2 回に分けて食後に投与し、その後は 2 日ごとに 1 日用量として 400mg 以下ずつ漸増する。維持用量は体重 30.1～50.0kg の患者には 1 日 1,800mg、体重 50.1～70.0kg の患者には 1 日 2,400mg、体重 70.1kg 以上の患者には 1 日 3,200mg とし、1 日 2 回に分けて食後に投与する。症状により維持用量を超えない範囲で適宜増減するが、増量は 2

日以上の間隔をあけて 1 日用量として 400mg 以下ずつ行うこと。

**▶エクメット配合錠 HD** ㊒

Equmet HD（配合剤） 〔ノバルティス〕

| 1 錠中： | |
|---|---|
| ビルダグリプチン | 50mg |
| メトホルミン塩酸塩 | 500mg |

**〔薬価〕**85.2 円/錠

**【効】**2 型糖尿病（ただし、ビルダグリプチン及びメトホルミン塩酸塩の併用による治療が適切と判断される場合に限る。）

**【用】**（**内**）1 回 1 錠を 1 日 2 回朝、夕に投与する。

（アプレミラスト）

**▶オテズラ錠 10mg** ㊒

Otezla 10mg/錠 〔セルジーン〕

**〔薬価〕**324.2 円/錠

**▶オテズラ錠 20mg** ㊒

Otezla 20mg/錠

**〔薬価〕**648.4 円/錠

**▶オテズラ錠 30mg** ㊒

Otezla 30mg/錠

**〔薬価〕**972.6 円/錠

**【効】**局所療法で効果不十分な尋常性乾癬、関節症性乾癬

**【用】**（**内**）以下のとおり投与する。1 日目：朝 10mg、2 日目：朝 10mg、夕 10mg、3 日目：朝 10mg、夕 20mg、4 日目：朝 20mg、夕 20mg、5 日目：朝 20mg、夕 30mg、6 日目以降：朝 30mg、夕 30mg

（マシテンタン）

**▶オプスミット錠 10mg** ㊒

Opsumit 10mg/錠 〔アクテリオン〕

**〔薬価〕**14,594 円/錠

**【効】**肺動脈性肺高血圧症

**【用】**（**内**）10mg を 1 日 1 回投与する。

（ルキソリチニブリン酸塩）

**▶ジャカビ錠 5mg** ㊒

Jakavi 5mg/錠 〔ノバルティス〕

**〔薬価〕**3,706.8 円/錠

**【効】**①骨髄線維症 ②真性多血症（既存治療が効果不十分又は不適当な場合に限る）

**【用】**（**内**）①本剤を 1 日 2 回、12 時間毎を目安に投与する。用量は、1 回 5mg～25mg の範囲とする。 ②1 回 10mg を開始用量とし、1 日 2 回、12 時間毎を目安に経口投与する。1 回 25mg、1 日 2 回を超えないこと。

（テノホビルアラフェナミドフマル酸塩）

**▶ベムリディ錠 25mg** ㊒

Vemlidy 25mg/錠 〔ギリアド〕

**〔薬価〕**996.5 円/錠

**【効】**B 型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認された B 型慢性肝疾患における B 型肝炎ウイルスの増殖抑制

**【用】**（**内**）1 回 25mg を 1 日 1 回投与する。

（ビマトプロスト）

**▶グラッシュビスタ外用液剤 0.03%5mL**

GlashVista 0.3mg/mL 〔塩野義〕

**【効】**睫毛貧毛症

**【用】**（**外**）片眼ごとに、1 滴を本剤専用のアプリケータに滴下し、1 日 1 回就寝前に上眼瞼辺縁部の睫毛基部に塗布する。