

DRUG INFORMATION



DI ニュース 2017 No. 16

平成 29 年 6 月 9 日発行

院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

①院外新規採用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
インチュニブ錠 1mg(グアンファシン塩酸塩)	注意欠陥/多動性障害治療剤
エフィエント錠 3.75mg(プラスグレール塩酸塩)	抗血小板剤
タペンタ錠 100mg(タペンタドール塩酸塩)	持続性癌疼痛治療剤
ヤーズフレックス配合錠(ドロスピレノン、エチルエストラジオールベータデクス)	子宮内膜症に伴う疼痛・月経困難症治療剤
エビリファイ内用液 0.1% 1mL/包(アリピプラゾール)	抗精神病薬
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠(配合剤)	漢方製剤
クラシエ白虎加人参湯エキス錠(配合剤)	漢方製剤

⇒ 平成 29 年 6 月 16 日より処方開始の予定です。

(グアンファシン塩酸塩)

▶インチュニブ錠 1mg

〔劇〕

Intuniv 1mg/錠

〔塩野義〕

〔薬価〕412.2 円/錠

【効】小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD)

【用】(内) 50kg 未満の小児では 1 日 1mg、50kg 以上の小児では 1 日 2mg より投与を開始し、1 週間以上の間隔をあけて 1mg ずつ、下表の維持用量まで増量する。

下表の最高用量を超えないこととし、いずれも 1 日 1 回投与すること。

〔体重〕〔開始用量〕〔維持用量〕〔最高用量〕

17kg 以上 25kg 未満/1mg/1mg/2mg

25kg 以上 34kg 未満/1mg/2mg/3mg

34kg 以上 38kg 未満/1mg/2mg/4mg

38kg 以上 42kg 未満/1mg/3mg/4mg

42kg 以上 50kg 未満/1mg/3mg/5mg

50kg 以上 63kg 未満/2mg/4mg/6mg

63kg 以上 75kg 未満/2mg/5mg/6mg

75kg 以上/2mg/6mg/6mg

(プラスグレール塩酸塩)

▶エフィエント錠 3.75mg

Efient 3.75mg/錠

〔第一三共〕

〔薬価〕282.7 円/錠

【効】経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される下記の虚血性心疾患：急性冠症候群(不安定狭心症、非 ST 上昇心筋梗塞、ST 上昇心筋梗塞)、安定狭心症、陳旧性心筋梗塞

【用】(内) 投与開始日に 20mg を 1 日 1 回投与し、その後、維持用量として 1 日 1 回 3.75mg を投与する。

(タペンタドール塩酸塩)

▶タペンタ錠 100mg

〔麻劇〕

Tapenta 100mg/錠

〔ヤンセン〕

〔薬価〕391.7 円/錠

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

【用】(内) 1 日 50～400mg を 2 回に分けて投与する。

▶ヤーズフレックス配合錠

YazFlex (配合剤)

[バイエル]

1錠中：

ドロスピレノン

3mg

エチニルエストラジオールベータデクス 0.02mg

[薬価]275 円/錠

【効】子宮内膜症に伴う疼痛の改善、月経困難症

【用】(内) 1 日 1 錠を投与する。24 日目までは出血の有無にかかわらず連続投与する。25 日目以降に 3 日間連続で出血(点状出血を含む)が認められた場合、又は、連続投与が 120 日に達した場合は、4 日間休薬する。

休薬後は出血が終わっているか続いているかにかかわらず、連続投与を開始する。以後同様に連続投与と休薬を繰り返す。

(アリピプラゾール)

▶エビリファイ内用液 0.1%

劇

Abilify 1mg/mL

[大塚]

[薬価]83.4 円/mL

[貯法]遮光

【効】①統合失調症 ②双極性障害における躁症状の改善 ③うつ病・うつ状態(既存治療で十分な効果が認められない場合に限る) ④小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性

【用】(内) ①1 日 6～12mg を開始用量、1 日 6～24mg を維持用量とし、1 回又は 2 回に分けて投与する。1 日量は 30mg を超えないこと。②12～24mg を 1 日 1 回投与する。開始用量は 24mg とし、1 日量は 30mg を超えないこと。③3mg を 1 日 1 回投与する。増量幅は 1 日量として 3mg

とし、1 日量は 15mg を超えないこと。④1 日 1mg を開始用量、1 日 1～15mg を維持用量とし、1 日 1 回経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、増量幅は 1 日量として最大 3mg とし、1 日量は 15mg を超えないこと。

▶クラシエ半夏厚朴湯エキス錠

(配合剤)4 錠/包

[クラシエ]

[薬価]5.6 円/錠

[貯法]遮光

12 錠中、次記配合のエキス 1.5g：

ハンゲ 6、ブクリョウ 5、コウボク 3、ソヨウ 2、ショウキョウ 1.3

【効】気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声

【用】(内) 1 日 12 錠を 2～3 回に分割し、食前又は食間に投与する。

▶クラシエ白虎加人参湯エキス錠

(配合剤)4 錠/包

[クラシエ]

[薬価]13.1 円/錠

[貯法]遮光

12 錠中、次記配合のエキス 2.6g：

チモ 5、セッコウ 15、カンゾウ 2、ニンジン 1.5、コウベイ 8

【効】のどの渇きとほてりのあるもの

【用】(内) 1 日 12 錠を 2～3 回に分割し、食前又は食間に投与する。

②院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アデムパス錠 1.0mg(リオシグアト)	肺高血圧症治療剤
スンベプラカプセル 100mg(アスナブレビル)	C 型肝炎治療剤
ダクルインザ錠 60mg(ダクラタスビル塩酸塩)	C 型肝炎治療剤
プロサイリン錠 20μg(ベラプロストナトリウム)	血管拡張剤
モーラスパップ 60mg 14×20cm(ケトプロフェン)	経皮鎮痛消炎剤
グロウジェクト BC 注射用 8mg(ソマトロピン(遺伝子組換え))	ヒト成長ホルモン製剤

⇒ 在庫が無くなり次第中止としますが、平成 29 年 9 月 30 日を最終とします。