

DRUG INFORMATION



D I ニュース 2017 No. 23

平成 29 年 8 月 9 日発行

院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

平成 29 年 8 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
テクフィデラカプセル 120mg(フマル酸ジメチル)	多発性硬化症治療剤
テクフィデラカプセル 240mg(フマル酸ジメチル)	多発性硬化症治療剤
コムクロシャンプー0.05%(クロベタゾールプロピオン酸エステル)	外用頭部乾癬治療剤

(フマル酸ジメチル)

▶テクフィデラカプセル 120mg

Tecfidera 120mg/CP [バイオジェン J]

[薬価]2,037.2 円/CP

▶テクフィデラカプセル 240mg

Tecfidera 240mg/CP

[薬価]4,074.4 円/CP

【効】多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制

【用】(内) 1 回 120mg 1 日 2 回から投与を開始し、1 週間後に 1 回 240mg 1 日 2 回に増量する。いずれの場合も朝・夕食後に投与する。

(クロベタゾールプロピオン酸エステル)

▶コムクロシャンプー0.05% 125g

Ⓒ

Comclo 0.5mg/g

[マルホ]

[薬価]28.2 円/g

【効】尋常性乾癬

【用】(外)①初期用量として 1 日 150mg を 1 日 2 回に分けて投与し、1 週間以上かけて 1 日用量として 300mg まで漸増する。1 日最高用量は 600mg を超えないこととし、1 日 2 回に分けて投与する。②初期用量として 1 日 150mg を 1 日 2 回に分けて投与し、1 週間以上かけて 1 日用量として 300mg まで漸増した後、300～450mg で維持する。1 日最高用量は 450mg を超えないこととし、1 日 2 回に分けて投与する。1 日 1 回、乾燥した頭部に患部を中心に適量を塗布し、約 15 分後に水又は湯で泡立て、洗い流す。