

DRUG INFORMATION



2017 No. 27

平成29年9月11日発行

1. 医薬品の採用・中止・変更について..... 1

(平成29年9月7日 薬事委員会結果報告)

- ①院内新規試用医薬品
- ②院内採用中止医薬品
- ③院外採用中止医薬品
- ④製剤変更医薬品
- ⑤銘柄変更医薬品
- ⑥販売中止医薬品

2. 新規採用医薬品情報..... 5

- 【院内新規試用医薬品】
- 【製剤変更医薬品】
- 【銘柄変更医薬品】

岐阜大学医学部附属病院・薬剤部
医薬品情報管理室
(内線7083)

※ Drug Information は医学部・附属病院 HP の下記アドレスにて提供しています。
<http://www1.med.gifu-u.ac.jp/drug-info/>

電子メールによる連絡を希望される方は下記までご連絡下さい。
di8931@gifu-u.ac.jp

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ザイザルシロップ 0.05%(レボセチリジン塩酸塩)	アレルギー性疾患治療剤
ナルサス錠 2mg(ヒドロモルフォン塩酸塩)	持続性癌疼痛治療剤
ナルサス錠 6mg(ヒドロモルフォン塩酸塩)	持続性癌疼痛治療剤
ナルラピド錠 1mg(ヒドロモルフォン塩酸塩)	癌疼痛治療剤
ロコアテープ(エスフルルビプロフェン)	経皮吸収型鎮痛消炎剤
エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg(アリピプラゾール)	持続性抗精神病薬
オブチレイ 350 注シリンジ 135mL(イオベルソール)	非イオン性造影剤

⇒ 平成 29 年 9 月 20 日より処方開始の予定です。

②院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アルタットカプセル 75mg(ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩)	H ₂ 受容体拮抗薬
スルピリド錠 100mg「アメル」(スルピリド)	定型抗精神病剤
ビジクリア配合錠(リン酸二水素ナトリウム一水和物/無水リン酸水素二ナトリウム)	下剤
ペリアクチンシロップ 0.04%(シプロヘプタジン塩酸塩水和物)	抗ヒスタミン剤
セレベント 50 ディスカス(サルメテロールキシナホ酸塩)	β ₂ 受容体刺激剤
ボルタレンテープ 15mg(ジクロフェナクナトリウム)	消炎・鎮痛パップ剤
オメガシン点滴用 0.3g(ビアペネム)	抗生物質製剤(カルバペネム系)

⇒ 院内の在庫がなくなり次第、処方中止とします。

③院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
MS コンチン錠 30mg(モルヒネ硫酸塩水和物)	持続性癌疼痛治療剤
オブソ内服液 10mg(モルヒネ塩酸塩)	癌疼痛治療用内服液剤
ピートルチュアブル錠 250mg(スクロオキシ水酸化鉄)	高リン血症治療剤
プレタール散 20%(シロスタゾール)	抗血小板剤
ユーゼル錠 25mg(ホリナートカルシウム)	還元型葉酸製剤
パンドルローション 0.1%(酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン)	外用副腎皮質ホルモン剤
ラクティオンパップ 70mg(インドメタシン)	経皮吸収型鎮痛・消炎温感貼付剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を平成 29 年 12 月 31 日とします。

④製剤変更医薬品

変更前医薬品名(会社名) ⇒ 変更後医薬品名(会社名)	薬品分類
アクチット輸液 500mL (ボトル) ⇒ アクチット輸液 500mL (バッグ)	電解質製剤
ヴィーン D 輸液 500mL (ボトル) ⇒ ヴィーン D 輸液 500mL (バッグ)	電解質製剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

⑤銘柄変更医薬品

変更前医薬品名(会社名) ⇒ 変更後医薬品名(会社名)	薬品分類
ペントジン注射液 15(第一三共) ⇒ ソセゴン注射液 15mg (丸石)	鎮痛剤
カイトリル細粒 0.4%(中外) ⇒ グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」(日本ケミファ)	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤
ビスコート 0.5 眼粘弾剤(アルコン) ⇒ シェルガン 0.5 眼粘弾剤(参天)	眼科手術補助剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

⑥販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
セロトーン錠 10mg(アザセトロン塩酸塩)	5-HT ₃ 受容体拮抗型制吐剤

⇒ 在庫がなくなり次第、処方中止とします。

【院内新規試用医薬品】

(レボセチリジン塩酸塩)

▶ザイザルシロップ 0.05%

Xyzal 0.5mg/mL [グラクソ・スミスクライン]

〔薬価〕17.9 円/mL

〔貯法〕遮光

【効】アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症 小児：蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒

【用】(内) 成人：1 回 10mL を 1 日 1 回、就寝前に投与する。最高投与量は 1 日 20mL とする。小児（6 ヶ月以上 1 歳未満）：1 回 2.5mL を 1 日 1 回投与する。（1 歳以上 7 歳未満）：1 回 2.5mL を 1 日 2 回、朝食後及び就寝前に投与する。（7 歳以上 15 歳未満）：1 回 5mL を 1 日 2 回、朝食後及び就寝前に投与する。

(ヒドロモルフォン塩酸塩)

▶ナルサス錠 2mg

麻劇

Narusus 2mg/錠

〔第一三共〕

〔薬価〕202.8 円/錠

▶ナルサス錠 6mg

麻劇

Narusus 6mg/錠

〔薬価〕530.2 円/錠

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

【用】(内) 4～24mg を 1 日 1 回投与する。

(ヒドロモルフォン塩酸塩)

▶ナルラピド錠 1mg

麻劇

Narurapid 1mg/錠

〔第一三共〕

〔薬価〕110.6 円/錠

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

【用】(内) 4～24mg を 4～6 回に分割投与する。

(エスフルルビプロフェン)

▶ロコアテープ

劇

Loqoa 40mg/枚

〔大正富山〕

〔薬価〕44.8 円/枚

〔貯法〕遮光

【効】変形性関節症における鎮痛・消炎

【用】(外) 1 日 1 回、患部に貼付する。同時に 2 枚を超えて貼付しないこと。

(アリピプラゾール水和物)

▶エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg

劇

Abilify 400mg/V

〔大塚製薬〕

〔薬価〕46,480 円/枚

【効】統合失調症

【用】(注) 1 回 400mg を 4 週に 1 回臀部筋肉内又は三角筋内に投与する。症状、忍容性に応じて 1 回量 300mg に減量する。

(イオベルソール)

▶オプチレイ 350 注シリンジ 135mL

Optiray 350mg/本

〔富士〕

〔薬価〕10,192 円/枚

〔貯法〕遮光

【効】腹部のコンピューター断層撮影における造影

【用】(注) 1 回 90～150mL を使用する。

【製剤変更医薬品】

▶アクチット輸液 500mL

Actit (配合剤) 500mL/袋 [扶桑]

【薬価】199 円/袋

【組成：JUS D.I.参照】

【効】経口摂取が不能または不十分な場合の水分・電解質の補給・維持、エネルギーの補給

【用】(注)1 回 500～1,000mL を徐々に静脈内に点滴注入する。投与速度はマルトース水和物として 1 時間あたり 0.5g/kg 体重以下とする。

▶ヴィーン D 輸液 500mL

Veen-D (配合剤) 500mL/袋 [扶桑]

【薬価】193 円/袋

【組成：JUS D.I.参照】

【効】循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給・補正、代謝性アシドーシスの補正、エネルギーの補給

【用】(注)1 回 500～1,000mL を点滴静注する。投与速度はブドウ糖として 1 時間あたり 0.5g/kg 体重以下とする。

【銘柄変更医薬品】

(ペンタゾシン)

▶ソセゴン注射液 15mg

Ⓒ

Sosegon 15mg/1mL/A

[丸石]

【薬価】65 円/ A

【効】①下記疾患並びに状態における鎮痛：各種癌、術後、心筋梗塞、胃・十二指腸潰瘍、胃・尿路結石、閉塞性動脈炎、胃・尿管・膀胱検査器具使用時
②麻酔前投薬及び麻酔補助

【用】(注)①下記疾患 1 回 15mg を筋肉内又は皮下に注射し、その後必要に応じて、3～4 時間毎に反復注射する。②30～60mg を筋肉内、皮下又は静脈内に注射する。

(グラニセトロン塩酸塩)

▶グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」ⒸⒹ

Granisetron 2mg/2g/包

[第一三共]

【薬価】774.1 円/包

【効】抗悪性腫瘍剤（シスプラチン等）投与及び放射線照射に伴う消化器症状（悪心、嘔吐）

【用】(内) 1 回 2mg を 1 日 1 回投与する。

▶シェルガン 0.5 眼粘弾剤

Ⓓ

Shellgan0.5 (配合剤) 0.5mL/筒

[参天]

【薬価】5,658.7 円/筒

1mL 中：

精製ヒアルロン酸ナトリウム

30mg

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 40mg

【効】次の一連の眼科手術における手術補助：超音波乳化吸引法による白内障摘出術及び眼内レンズ挿入術

【用】(注)超音波乳化吸引法による白内障摘出時には 0.1～0.4mL、眼内レンズ挿入時には 0.1～0.3mL を前房内へ注入する。必要に応じて眼内レンズのコーティングに 0.1mL 使用する。