



平成29年11月6日発行


「リクシアナ錠」および「リフキシマ錠」のオーダーに注意してください！！

「リクシアナ錠」(成分名:エドキサバントシル酸塩、抗凝固剤)と、「リフキシマ錠」(成分名:リファキシミン、肝性脳症における高アンモニア血症改善薬)について、販売名が非常に類似していることから、誤った調剤による死亡例が他施設より報告されました。

＜事例＞

肝硬変による肝性脳症に対してリフキシマ錠200mgが処方されたところ、誤って抗凝固剤のリクシアナ錠30mgが調剤された。結果として通常用量を超えたリクシアナ錠を複数回服用したことで、消化管出血が発現し、死亡に至った。

現在、当院に両薬剤が採用されております。今回の事例から、名称類似に関連した医療事故防止対策の一環として、**オーダーする際に注意喚起のメッセージを表示するように変更します。**



販売名	リクシアナ錠 【抗血栓薬】	リフキシマ錠 【高アンモニア血症治療薬】
製剤写真	リクシアナ®錠30mg 	リフキシマ®錠200mg 
効能・効果	①非弁膜性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 ②静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制 ③下記の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術	肝性脳症における高アンモニア血症の改善
用法・用量	＜効能・効果①②＞ 通常、成人には、エドキサバンとして以下の用量を 1日1回 経口投与する。 体重60kg以下: 30mg 体重60kg超: 60mg なお、腎機能、併用薬に応じて 1日1回30mg に減量する。 ＜効能・効果③＞ 通常、成人には、エドキサバンとして 30mg を 1日1回 経口投与する。	通常、成人にはリファキシミンとして1回400mgを 1日3回 食後に経口投与する。

今回の薬剤を含め、類似名称薬剤の処方時には十分な注意をお願い致します。

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室(内線 7083)までご連絡下さい。

(文責:星野)