



## オランザピン製剤は糖尿病患者に禁忌です！

オランザピン製剤に以下の効能が正式に追加となりました。  
「抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心嘔吐)」

※以下、ジフシキサ錠の添付文書より抜粋

【用法・用量】

・通常、成人にはオランザピン **5mg** を1日1回経口投与する。1日量は **10mg** を超えないこと。

【使用上の注意】

・他の制吐剤との併用で用いる。**単独では用いない。**

・投与期間は **1サイクル6日間** を目安とする。

当院においては、オランザピン製剤の**約5割**が  
精神科以外(統合失調症以外)で処方されています。

(2017/1-2017/12 薬剤部調べ)

オランザピン製剤は**糖尿病患者に禁忌**です。  
**糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡**による死亡の危険性について  
平成14年4月に **緊急安全性情報** が発出されています。

使用開始前に糖尿病の検索(血糖、HbA1c等)を行い、  
投与中は血糖値の測定等の観察を行い、下記症状の出現に注意してください。



★オランザピン製剤使用不可患者の制吐対策に関し、  
お困りの点があれば、各病棟薬剤師にぜひご相談ください★

※JASCC(日本サポーターズケア学会)では、上記厚労省通知に関し、  
使用上のより現実的な注意点を補足されていますので、ぜひ一読を！！

不明な点につきましては薬剤部・医薬品情報管理室(内線 7083)、  
または各病棟担当薬剤師までご連絡下さい。(文責:関谷)