



薬剤部 平成30年2月7日発行

医薬品の採用・中止・変更について -平成30年2月5日薬事委員会WG結果報告-

①院外新規採用医薬品(平成30年2月16日開始)

医薬品名(成分名)	薬品分類
イブランスカプセル 25mg(パルボシクリブ)	抗悪性腫瘍剤(CDK4/6 阻害剤)
イブランスカプセル 125mg(パルボシクリブ)	抗悪性腫瘍剤(CDK4/6 阻害剤)
イルベサルタン錠 100mg「DSPB」(イルベサルタン)	長時間作用型 ARB
イルベサルタン錠 200mg「DSPB」(イルベサルタン)	長時間作用型 ARB
オキシコンチン TR 錠 5mg(オキシコドン塩酸塩水和物)	持続性癌疼痛治療剤
オキシコンチン TR 錠 10mg(オキシコドン塩酸塩水和物)	持続性癌疼痛治療剤
オキシコンチン TR 錠 40mg(オキシコドン塩酸塩水和物)	持続性癌疼痛治療剤
ビブレッソ徐放錠 50mg(クエチアピルフマル酸塩)	双極性障害のうつ症状治療薬
ビブレッソ徐放錠 150mg(クエチアピルフマル酸塩)	双極性障害のうつ症状治療薬
ルバフィン錠 10mg(ルパタジルフマル酸塩)	アレルギー性疾患治療剤

②院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アバプロ錠 100mg(イルベサルタン)	長時間作用型 ARB
アバプロ錠 200mg(イルベサルタン)	長時間作用型 ARB
オキシコンチン錠 5mg(オキシコドン塩酸塩水和物)	持続性癌疼痛治療剤
オキシコンチン錠 10mg(オキシコドン塩酸塩水和物)	持続性癌疼痛治療剤
オキシコンチン錠 40mg(オキシコドン塩酸塩水和物)	持続性癌疼痛治療剤

⇒ 平成30年2月16日付で採用中止とします。

(パルボシクリブ)

▶イブランスカプセル 25mg (劇)

Ibrance 25mg/Cp [ファイザー]

[薬価]5,576.4 円/Cp

▶イブランスカプセル 125mg (劇)

Ibrance 125mg/Cp

[薬価]22,560.3 円/Cp

【効】手術不能又は再発乳癌

【用】(内) 内分泌療法との併用において、1 日 1 回 125mg を 3 週間連続して食後に投与し、その後 1 週間休薬する。

(イルベサルタン)

▶イルベサルタン錠 100mg 「DSPB」 (後)

Irbesartan 100mg/錠 [大日本住友]

[薬価]56.2 円/錠

▶イルベサルタン錠 200mg 「DSPB」 (後)

Irbesartan 200mg/錠

[薬価]84.3 円/錠

【効】高血圧症

【用】(内) 50～100mg を 1 日 1 回投与する。

(オキシコドン塩酸塩水和物)

▶オキシコンチン TR 錠 5mg (麻劇)

Oxycontin 5mg/錠 [塩野義]

[薬価]139.6 円/錠

▶オキシコンチン TR 錠 10mg (麻劇)

Oxycontin 10mg/錠

[薬価]261.3 円/錠

▶オキシコンチン TR 錠 40mg (麻劇)

Oxycontin 40mg/錠

[薬価]891.4 円/錠

【効】中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛

【用】(内) 1 日 10～80mg を 2 回に分割投与する。

(クエチアピソフマル酸塩)

▶ビプレッソ徐放錠 50mg (劇)

Bipresso 50mg/錠 [アステラス]

[薬価]71 円/錠

▶ビプレッソ徐放錠 150mg (劇)

Bipresso 150mg/錠

[薬価]188.6 円/錠

【効】双極性障害におけるうつ症状の改善

【用】(内) 1 回 50mg より投与を開始し、2 日以上の間隔をあけて 1 回 150mg へ増量する。その後、さらに 2 日以上の間隔をあけて、1 回 300mg に増量する。1 日 1 回就寝前とし、食後 2 時間以上あけて投与する。

(ルパタジンフマル酸塩)

▶ルパフィン錠 10mg

Rupafin 10mg/錠 [田辺三菱]

[薬価]69.4 円/錠

【効】アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒

【用】(内) 12 歳以上の小児及び成人には 1 回 10mg を 1 日 1 回投与する。症状に応じて、1 回 20mg に増量できる。