

DRUG INFORMATION 2018 No.9



薬剤部 平成30年4月3日発行

院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

平成30年4月16日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
トレリーフ OD 錠 50mg (ゾニサミド)	レボドパ賦活型パーキンソン病治療薬
リクシアナ OD 錠 60mg (エドキサバントシル酸塩水和物)	経口 FXa 阻害剤
レンビマカプセル 4mg (レンバチニブメシル酸塩)	抗悪性腫瘍剤

(ゾニサミド)

▶トレリーフ OD 錠 50mg

Ⓒ

Trierief 50mg/錠 [大日本住友]

[薬価]1,422.8 円/錠

【効】パーキンソン病（レボドパ含有製剤に他の抗パーキンソン病薬を使用しても十分に効果が得られなかった場合）

【用】(内) レボドパ含有製剤と併用する。1日1回25mgを投与する。パーキンソン病における症状の日内変動（wearing-off 現象）の改善には、1日1回50mgを投与する。

(エドキサバントシルサン塩水和物)

▶リクシアナ OD 錠 60mg

Lixiana 60mg/錠 [第一三共]

[薬価]545.6 円/錠

【効】①非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 ②静脈血栓塞栓症（深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症）の治療および再発抑制 ③下記の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制：膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術

【用】(内) ①②体重 60kg 超の場合は 60mg、体重 60kg 以下の場合は 30mg を1日1回投与する。腎機能、併用薬に応じて1日1回30mgに減量する。 ③30mgを1日1回投与する。

(レンバチニブメシル酸塩)

▶レンビマカプセル 4mg

Ⓒ

Lenvima 4mg/Cp [エーザイ]

[薬価]3,956.4 円/Cp

【効】①根治切除不能な甲状腺癌 ②切除不能な肝細胞癌

【用】(内) ①1日1回24mgを投与する。②体重60kg 以上の場合は12mg、体重60kg 未満の場合は8mgを1日1回投与する。