



2022年5月20日 発行

金属等とのキレート形成による吸収低下にご注意ください。

金属等含有薬剤と併用した場合、キレートを形成し難溶性となり、吸収が低下する薬剤があります。同時投与を避けるべき薬剤を一覧にしました。

金属等含有薬剤と相互作用のある薬剤については、相互作用のない薬剤への変更や、両剤の投与間隔を少なくとも2時間以上空けることをご検討ください。

金属含有薬剤等と相互作用のある院内採用薬一覧

AUC: 薬物の吸収率の指標

薬効	一般名	代表的な販売名	AUC 低下率
抗てんかん剤	ガバペンチン	ガバペン	20%
H1受容体拮抗剤	フェキソフェナジン塩酸塩	アレグラ	40%
HMG-CoA還元酵素阻害剤	ロスバスタチンカルシウム	クレストール	54%
ビスホスホネート製剤	リセドロン酸ナトリウム水和物	ベネット	
	アレンドロン酸ナトリウム水和物	フォサマック、ボナロン	
	ミノドロン酸水和物	ボノテオ	
セフェム抗菌剤	セフジニル	セフゾン	90%
テトラサイクリン系抗菌剤	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	ビブラマイシン	
	ミノサイクリン塩酸塩	ミノマイシン	
マクロライド系抗菌剤	アジスロマイシン水和物	ジスロマック	24%
キノロン系抗菌剤	トスフロキサシントシル酸塩水和物	オゼックス	
	シタフロキサシン水和物	グレースビット	
	ガレノキサシンメシル酸塩水和物	ジェリナック	
	レボフロキサシン水和物	クラビット	
抗真菌剤	イトラコナゾール	イトリゾール	66%
抗結核剤	イソニアジド	イスコチン	
抗HIV剤(インテグラーゼ阻害剤)	ラルテグラビルカリウム	アイセントレス	45%
	ドルテグラビルナトリウム	デビケイ、ドウベイト、トリーメク	76%
	ビクテグラビルナトリウム	ビクタルビ	79%
免疫抑制剤	ミコフェノール酸モフェチル	セルセプト	15%
血清カリウム抑制剤	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	カリメート、アーガメイト	
	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	ケイキサレート	
金属解毒剤	デフェラシロクス	ジャドニュ	
	トリエンチン塩酸塩	メタライト	
	ペニシラミン	メタルカプターゼ	
造血刺激剤	エルトロンボパグ	レボレード	70%
甲状腺ホルモン剤	レボチロキシン	チラージン、チロナミン	
抗パーキンソン剤	レボドパ\カルビドパ水和物	デュオドーパ、レプリントン	
	エンタカポン	コムタン	
	ドロキシドパ	ドプス	

★薬物の吸収率は、併用する金属等含有薬剤により異なります。

※斜線は情報なし

当院採用の金属等含有薬剤

含有金属等	一般名	代表的な販売名
亜鉛	酢酸亜鉛	ノベルジン
	ポラプレジンク	プロマック
アルミニウム	天然ケイ酸アルミニウム	アドソルビン
	スクラルファート水和物	アルサルミン
	アルジオキサ	アルジオキサ
マグネシウム	マグコロール	クエン酸マグネシウム
	酸化マグネシウム	マグミット
アルミニウム/マグネシウム	水酸化アルミニウムゲル/水酸化マグネシウム	マルファ
カルシウム	ポリカルボフィルカルシウム	ポリフル
	乳酸カルシウム	乳酸カルシウム
	Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物	アスパラ－CA
カルシウム/マグネシウム	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール/炭酸マグネシウム	デノタス
鉄	乾燥硫酸鉄	フェロ・グラデュメット
	クエン酸第二鉄水和物	リオナ
	クエン酸第一鉄ナトリウム	クエンメット、フェロミア
	スクロオキシ水酸化鉄	ピートル
	沈降炭酸カルシウム	カルタン、炭カル
ランタン	炭酸ランタン水和物	ホスレノール
セベラマー	セベラマー	レナジェル
ビキサロマー	ビキサロマー	キックリン

参考：インタビューフォーム

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室(内線 7083)までご連絡下さい。 （文責：山崎）