



オブジーボ点滴静注の用量が変更になります！

2018年8月、オブジーボ点滴静注の固定用量の承認に伴い、体重換算の用法用量から固定用量へ添付文書の改訂が行われました。



《今回変更になる用量と適応》



	効能・効果	新用法・用量と投与時間
オブジーボ 単剤投与時	④ 悪性黒色腫 ④ 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ④ 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 ④ 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫 ④ 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌 ④ がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌 ④ がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫	オブジーボ：240mg 30分以上かけて点滴静注、2週間間隔
オブジーボと ヤーボイの 併用投与時	④ 根治切除不能な悪性黒色腫 (ヤーボイとの併用投与時のみ、その後の単剤投与時は除く)	オブジーボ：80mg 30分以上かけて点滴静注、3週間間隔 ヤーボイ：3mg/kg 90分かけて点滴静注、3週間間隔
	④ 化学療法未治療の根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 (ヤーボイとの併用投与時のみ、その後の単剤投与時は除く)	オブジーボ：240mg 30分以上かけて点滴静注、3週間間隔 ヤーボイ：1mg/kg 30分かけて点滴静注、3週間間隔

《院内における対応》

オブジーボ点滴静注の添付文書の改訂に伴い、2018年11月1日よりオブジーボ点滴静注を含むレジメンにおいて、用量が変更となります。

既存のレジメンを使用することができなくなりますのでご注意ください(DOオーダーは出来ません)。切替日以降のオーダーは、すでにオーダー入力済みのレジメンを含め、新しいレジメンでオーダーし直していただくようお願いいたします。