

薬剤部からのお知らせ 2018 No.18



平成 30 年 12 月 5 日発行

院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

平成 30 年 12 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アディノベイト静注用キット 2000 (ルリオクトコグアルファペゴル)	血液凝固第Ⅷ因子製剤
デュオドーパ配合経腸用液 (レボドパ、カルビドパ水和物)	抗パーキンソン剤
ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター (ベリムマブ)	SLE 治療剤
オルミエント錠 2mg (バリシチニブ)	関節リウマチ治療剤
ケブザラ皮下注 150mg シリンジ (サリルマブ)	関節リウマチ治療剤
ケブザラ皮下注 200mg シリンジ (サリルマブ)	関節リウマチ治療剤
ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター (サリルマブ)	関節リウマチ治療剤
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター (サリルマブ)	関節リウマチ治療剤
シムジア皮下注 200mg オートクリックス (セルトリズマブペゴル)	関節リウマチ治療剤
ベージニオ錠 50mg (アベマシクリブ)	乳癌治療剤
ベージニオ錠 100mg (アベマシクリブ)	乳癌治療剤
ベージニオ錠 150mg (アベマシクリブ)	乳癌治療剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒	漢方製剤

(ルリオクトコグアルファペゴル)

▶アディノベイト静注用キット 2000

Adynovate 2,000 国際単位/キット

[シャイアー・ジャパン]

〔薬価〕200,359 円/キット

〔貯法〕禁凍結、2～8℃

【効】血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制

【用】(注) 本剤を添付の溶解液 5mL で溶解し、緩徐に静注する。10mL/分を超えない速度で注入すること。

1 回 10～30 国際単位/kg を投与する。

定期的に投与する場合、成人及び 12 歳以上の小児には、1 回 40～50 国際単位/kg を週 2 回投与するが、患者の状態に応じて 1 回 60 国際単位/kg に増量できる。

12 歳未満の小児には、1 回 40～60 国際単位/kg を週 2 回投与するが、患者の状態に応じて 1 回 80 国際単位/kg を超えない範囲で増量できる。

▶デュオドーパ配合経腸用液

Duodopa (配合剤)

[アッヴィ]

〔薬価〕15,004.3 円/カセット

1 カセット (100mL) 中：

レボドパ	2000mg
カルビドパ水和物	500mg

〔貯法〕禁凍結、2～8℃、遮光

【効】レボドパ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病の症状の日内変動 (wearing-off 現象) の改善

【用】(内) 本剤投与前の経口レボドパ量に応じて初回投与量を決定し、朝の投与及び持続投与に分けて胃瘻を通じて空腸に直接投与する。その後は患者の症状により、以下の用量範囲で投与量を調整する。

朝の投与として 5～10mL を 10～30 分かけて投与した後、2～6mL/時間で持続投与する。1 日の最大投与時間は 16 時間とする。1 回あたりの追加投与は 0.5～2.0mL とする。朝の投与は 15mL、持続投与は 10mL/時間を超えないこととする。1 日総投与量は 100mL を超えないこととする。

(ベリムマブ)

▶ベンリスタ皮下注 200mg オートインジェクター (劇)

Benlysta 200mg/1mL/キット

[グラクソ・スミスクライン]

[薬価]24,547 円/キット

[貯法]遮光、2～8℃

【効】既存治療で効果不十分な全身性エリテマトーデス

【用】(注)1 回 200mg を 1 週間の間隔で皮下注射する。

(バリシチニブ)

▶オルミエント錠 2mg (劇)

Olumiant 2mg/錠 [日本イーライリリー]

[薬価]2,690.4 円/錠

【効】既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)

【用】(内)4mg を 1 日 1 回投与する。状態に応じて 2mg に減量する。

(サリルマブ)

▶ケブザラ皮下注 150mg シリンジ (劇)

Kevzara 150mg/筒 [サノフィ]

[薬価]44,556 円/筒

▶ケブザラ皮下注 200mg シリンジ (劇)

Kevzara 200mg/筒

[薬価]59,120 円/筒

▶ケブザラ皮下注 150mg オートインジェクター (劇)

Kevzara 150mg/キット

[薬価]44,945 円/キット

▶ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター (劇)

Kevzara 200mg/キット

[薬価]59,509 円/キット

[貯法]遮光、禁凍結、2～8℃

【効】既存治療で効果不十分な関節リウマチ

【用】(注)1 回 200mg を 2 週間隔で皮下投与する。状態により 1 回 150mg に減量する。

(セルトリズマブペゴル)

▶シムジア皮下注 200mg オートクリックス (劇)

Cimzia 150mg/キット [アステラス]

[薬価]61,202 円/キット

[貯法]遮光、禁凍結、2～8℃

【効】関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)

【用】(注)1 回 400mg を初回、2 週後、4 週後に皮下注射し、以後 1 回 200mg を 2 週間の間隔で皮下注射する。症状安定後には、1 回 400mg を 4 週間の間隔で皮下注射できる。

(アベマシクリブ)

▶ベージニオ錠 50mg (劇)

Verzenio 50mg/錠 [日本イーライリリー]

[薬価]3,258.7 円/錠

▶ベージニオ錠 100mg (劇)

Verzenio 100mg/錠

[薬価]5,949.2 円/錠

▶ベージニオ錠 150mg (劇)

Verzenio 100mg/錠

[薬価]8,460.1 円/錠

【効】ホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌

【用】(内)1 回 150mg を 1 日 2 回投与する。

▶ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒

(配合剤) 2.5g/包 [ツムラ]

[薬価]21.2 円/包

7.5g 中下記の配合エキス 4.6g : サイコ 2、オウゴン 1.5、オウバク 1.5、オウレン 1.5、カココン 1.5、カンゾウ 1.5、キキョウ 1.5、ゴボウシ 1.5、サンシシ 1.5、ジオウ 1.5、シャクヤク 1.5、センキュウ 1.5、トウキ 1.5、ハッカ 1.5、レンギョウ 1.5

【効】かんの強い傾向のある小児の次の諸症：神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹

【用】(内)1 日 7.5g を 2～3 回に分割し、食前又は食間に投与する。