

薬剤部からのお知らせ 2018 No.19



平成30年12月10日

医薬品の採用・中止・変更について —平成30年12月6日薬事委員会結果報告—

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
エフィエント錠 3.75mg(プラスグレル塩酸塩)	抗血小板剤
エフィエント OD 錠 20mg(プラスグレル塩酸塩)	抗血小板剤
グーフィス錠 5mg(エロピキシバット水和物)	慢性便秘症治療剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	漢方製剤
ビブレッソ徐放錠 50mg(クエチアピンフマル酸塩)	双極性障害のうつ症状治療剤
アノーロエリプタ 30 吸入用 (ウメクリジニウム臭化物、ビランテロールトリフェニル酢酸塩)	COPD 治療配合剤
エイベリス点眼液 0.002%(オミデネパグイソプロピル)	緑内障・高眼圧症治療剤
モビコール配合内用剤	慢性便秘症治療剤

⇒ 平成30年12月18日より処方開始の予定です。

②製剤変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名(成分名)	薬品分類
パロジェクトゾル 100 ⇒ エネマスター注腸散 (硫酸バリウム)	注腸用 X 線造影剤
エスラックス静注 50mg/5.0mL ⇒ ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL 「マルイシ」	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

③院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アシテアダニ舌下錠 100 単位 (IR) (ヤケヒョウダニエキス原末、コナヒョウダニエキス原末)	ダニアレルギー減感作療法剤
ネオキシテープ 73.5mg(オキシブチニン塩酸塩)	過活動膀胱治療剤
ベストロン耳鼻科 1%(塩酸セフメノキシム)	外用抗生物質製剤
アトワゴリバース静注シリンジ (ネオスチグミンメチル硫酸塩、アトロピン硫酸塩水和物)	副交感神経興奮剤
アナフラニール点滴静注液 25mg(クロミプラミン塩酸塩)	モノアミン再取り込み阻害剤
ドプラム注射液 400mg(ドキサプラム塩酸塩水和物)	呼吸促進剤
ベクロニウム静注用 10mg 「F」 (ベクロニウム臭化物)	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
リスモダン P 静注 50mg(ジソピラミドリン酸塩)	抗不整脈剤 (第I群)

⇒ 院内の在庫がなくなり次第、中止とします。

④院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アラバ錠 20mg(レフルノミド)	抗リウマチ剤
ジフルカンカプセル 50mg(フルコナゾール)	深在性真菌症治療剤
ジフルカンドライシロップ 1400mg(フルコナゾール)	深在性真菌症治療剤
ツムラ茵陳五苓散エキス顆粒	漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒	漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒	漢方製剤
ツムラ茯苓飲エキス顆粒	漢方製剤
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」(ヘパリン類似物質)	血行促進・皮膚保湿剤
アディノベイト静注用 2000(ルリオクトコグアルファペゴル)	血液凝固第Ⅷ因子製剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を平成 31 年 3 月 31 日とします。

⑤販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	(外)：院外専用医薬品	薬品分類
インテバン SP25(インドメタシン) ^(外)		鎮痛・解熱・抗炎症剤
ジメンシー配合錠(ダクラタスビル、アスナプレビル、ベクラブビル) ^(外)		抗ウイルス化学療法剤
スローケー錠 600mg(塩化カリウム) ^(外)		徐放性カリウム剤
ラシックス細粒 4%(フロセミド) ^(外)		利尿降圧剤
アクリノール 0.1%液「ヨシダ」(アクリノール)		外用殺菌消毒剤
コージネイト FS バイオセット注 2000(オクトコグアルファ) ^(外)		血液凝固第Ⅷ因子製剤

⇒ 在庫がなくなり次第、中止とします。

【院内新規試用医薬品】

(プラスグレル塩酸塩)

▶エフィエント錠 3.75mg

Efient 3.75mg/錠 [第一三共]

〔薬価〕276.1 円/錠

▶エフィエント OD 錠 20mg

Efient 20mg/錠

〔薬価〕1,128.8 円/錠

【効】経皮的冠動脈形成術(PCI)が適用される下記の虚血性心疾患：急性冠症候群(不安定狭心症、非 ST 上昇心筋梗塞、ST 上昇心筋梗塞)、安定狭心症、陳旧性心筋梗塞

【用】(内) 投与開始日に 20mg を 1 日 1 回投与し、その後、維持用量として 1 日 1 回 3.75mg を投与する。

(エロビキシバット水和物)

▶ゲーフィス錠 5mg

Goofice 5mg/錠 [E Aファーマ]

〔薬価〕105.8 円/錠

【効】慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)

【用】(内) 10mg を 1 日 1 回食前に投与する。最高用量は 1 日 15mg とする。

▶ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒

(配合剤) 2.5g/包 [ツムラ]

〔薬価〕9.6 円/包

7.5g 中下記の割合の乾燥エキス 2.5g(ハング
6g、ブクリョウ 5g、コウボク 3g、ソヨウ 2g、
ショウキョウ 1g)

【効】気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気等を伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、神経性食道狭窄症、不眠症

【用】(内) 1 日 7.5g を 2～3 回に分割し、食前又は食間に投与する。

(クエチアピンフマル酸塩)

▶ビプレッソ徐放錠 50mg

Ⓔ

Bipresso 50mg/錠 [共和薬品]

〔薬価〕69.5 円/錠

【効】双極性障害におけるうつ症状の改善

【用】(内) 1 回 50mg より投与を開始し、2 日以上の間隔をあけて 1 回 150mg へ増量する。その後、さらに 2 日以上の間隔をあけて、推奨用量である 1 回 300mg に増量する。いずれも 1 日 1 回就寝前とし、食後 2 時間以上あけて投与すること。

▶アノーロエリプタ 30 吸入用

Anoro (配合剤) 30 ブリスター/個 [グラクソ]

〔薬価〕7,924.7 円/キット

1 ブリスター中：
ウメクリジニウム臭化物 62.5μg
ビランテロールトリフェニル酢酸塩 25μg

【効】慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解(長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 β₂ 刺激剤の併用が必要な場合)

【用】(外) 1 吸入を 1 日 1 回吸入投与する。

(オミデネパグイソプロピル)

▶エイベリス点眼液 0.002%

Ⓔ

Eybelis 2.5mL/本 [参天]

〔薬価〕945.3 円/mL

〔貯法〕遮光、2～8℃

【効】緑内障、高眼圧症

【用】(外) 1 回 1 滴、1 日 1 回点眼する。

▶モビコール配合内用剤

(配合剤) 6.8523g/包

〔持田〕

〔薬価〕83.9 円/包

1 包中:マクロゴール 4000 6.5625g 塩化ナトリウム 0.1754g 炭酸水素ナトリウム 0.0893g 塩化カリウム 0.0251g

【効】慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)

【用】(内) 2 歳以上 7 歳未満の幼児には初回用量として 1 回 1 包を 1 日 1 回投与する。以降、症状に応じて適宜増減し、1 日 1~3 回投与、最大投与量は 1 日量として 4 包まで(1 回量として 2 包まで)とする。増量は 2 日以上の間隔をあけて行い、増量幅は 1 日量として 1 包までとする。

7 歳以上 12 歳未満の小児には初回用量として 1 回 2 包を 1 日 1 回投与する。以降、症状に応じて適宜増減し、1 日 1~3 回投与、最大投与量は 1 日量として 4 包まで(1 回量として 2 包まで)とする。増量は 2 日以上の間隔をあけて行い、増量幅は 1 日量として 1 包までとする。

成人及び 12 歳以上の小児には初回用量として 1 回 2 包 1 日 1 回投与する。以降、症状に応じて適宜増減し、1 日 1~3 回投与、最大投与量は 1 日量として 6 包まで(1 回量として 4 包まで)とする。増量は 2 日以上の間隔をあけて行い、増量幅は 1 日量として 2 包までとする。

【製剤変更医薬品】

(硫酸バリウム)

▶エネマスター注腸散

Enemastar 400g/袋

〔伏見〕

〔薬価〕1.45 円/g

【効】消化管(大腸)撮影

【用】(注) 検査部位及び検査方法に応じ、本剤の適量に適量の水を加えて適当な濃度とし、その適量を注腸する。(但し、本剤は経口投与してはならない)成人は下記量を標準とする。

検査部位	検査方法	硫酸バリウム濃度(w/v%)	用量(mL)
大腸	(注腸)	20~130	200~2,000

(ロクロニウム臭化物)

▶ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「マ
ルイシ」

Ⓐ

Rocuronium 50mg/5mL/瓶

〔丸石〕

〔薬価〕413 円/瓶

【効】麻酔時の筋弛緩、気管挿管時の筋弛緩

【用】(注) 挿管用量として 0.6mg/kg を静脈内投与し、術中必要に応じて 0.1~0.2mg/kg を追加投与する。持続注入により投与する場合は、7µg/kg/分の投与速度で持続注入を開始する。挿管用量の上限は 0.9mg/kg までとする。