

薬剤部からのお知らせ 2019 No.12



2019年5月8日発行

院外処方薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

2019年5月16日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ビクトルビ配合錠(ビクテグラビルナトリウム、エムトリシタビン、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩)	HIV 感染症治療剤
ミネプロ錠 1.25mg(エサキセレン)	高血圧症治療剤
ミネプロ錠 2.5mg(エサキセレン)	高血圧症治療剤
レミニール OD 錠 12mg(ガランタミン臭化水素酸塩)	アルツハイマー型認知症治療剤

▶ビクトルビ配合錠

Biktarvy (配合剤)

〔ギリアド〕

〔薬価〕6,972.3 円/錠

1 錠中：

ビクテグラビル

50mg

エムトリシタビン

200mg

テノホビル アラフェナミド

25mg

【効】HIV-1 感染症

【用】(内) 1 回 1 錠を 1 日 1 回投与する。

(エサキセレン)

▶ミネプロ錠 1.25mg

Minnebro 1.25mg/錠

〔第一三共〕

〔薬価〕46.9 円/錠

▶ミネプロ錠 2.5mg

Minnebro 2.5mg/錠

〔薬価〕89.9 円/錠

【効】高血圧症

【用】(内) 2.5mg を 1 日 1 回投与する。なお、効果不十分な場合は、5mg まで増量することができる。

(ガランタミン臭化水素酸塩)

▶レミニール OD 錠 12mg

Reminyl 12mg/錠

〔武田〕

〔薬価〕226.9 円/錠

【効】軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

【用】(内) 1 日 8mg(1 回 4mg を 1 日 2 回)から開始し、4 週間後に 1 日 16mg(1 回 8mg を 1 日 2 回)に増量し、投与する。症状に応じて 1 日 24mg(1 回 12mg を 1 日 2 回)まで増量できるが、増量する場合は変更前の用量で 4 週間以上投与した後に増量する。