

薬剤部からのお知らせ 2019 No.13



2019年6月4日発行

院外処方薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

2019年6月16日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アーリーダ錠 60mg(アパルタミド)	前立腺癌治療剤
シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU(スギ花粉エキス)	スギ花粉症 減感作療法薬
ロソーゼット配合錠 LD(エゼチミブ、ロスバスタチン)	脂質異常症治療配合剤
ロソーゼット配合錠 HD(エゼチミブ、ロスバスタチン)	脂質異常症治療配合剤
シンポニー皮下注 50mg オートインジェクター(ゴリムマブ)	関節リウマチ・潰瘍性大腸炎治療剤
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター(イクセキズマブ)	乾癬治療剤

(アパルタミド)

▶アーリーダ錠 60mg

〔劇〕

Erleada 60mg/錠

〔ヤンセン〕

〔薬価〕2,281.9 円/錠

【効】遠隔転移を有しない去勢抵抗性前立腺癌

【用】(内) 1日1回 240mg を投与する。患者の状態により適宜減量する。

(スギ花粉エキス)

▶シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU

Cedarcure 5,000JAU/錠

〔鳥居〕

〔薬価〕144.1 円/錠

【効】スギ花粉症(減感作療法)

【用】(内) 投与開始後1週間は、2,000JAU を1日1回1錠、投与2週目以降は、5,000JAU を1日1回1錠、舌下にて1分間保持した後、飲み込む。その後5分間は、うがいや飲食を控える。

▶ロソーゼット配合錠 LD

Rosuzet LD (配合剤)

〔バイエル〕

〔薬価〕177 円/錠

1錠中：

エゼチミブ

10mg

ロスバスタチン

2.5mg

▶ロソーゼット配合錠 HD

Rosuzet HD (配合剤)

〔薬価〕177 円/錠

1錠中：

エゼチミブ

10mg

ロスバスタチン

5mg

〔貯法〕遮光

【効】高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

【用】(内) 1日1回1錠を食後に投与する。

(ゴリムマブ)

▶シンポニー皮下注 50mg オートインジェクター ㊦

Simponi 50mg/0.5mL/キット [田辺]

〔薬価〕121,539 円/キット

〔貯法〕遮光、禁凍結、2～8℃

【効】①既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)②中等症から重症の潰瘍性大腸炎の改善及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)

【用】(注)①《メトトレキサートを併用する場合》50mg を 4 週に 1 回、皮下注射する。患者の状態に応じて 1 回 100mg を使用することができる。《メトトレキサートを併用しない場合》100mg を 4 週に 1 回、皮下注射する。

②初回投与時に 200mg、初回投与 2 週後に 100mg を皮下注射する。初回投与 6 週目以降は 100mg を 4 週に 1 回、皮下注射する。

(イキセキズマブ)

▶トルツ皮下注 80mg オートインジェクター ㊦

Taltz 80mg/キット [鳥居]

〔薬価〕146,244 円/キット

〔貯法〕禁凍結、2～8℃

【効】既存治療で効果不十分な下記疾患：尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症

【用】(注)初回に 160mg を皮下投与し、2 週後から 12 週後までは 1 回 80mg を 2 週間隔で皮下投与し、以降は 1 回 80mg を 4 週間隔で皮下投与する。12 週時点で効果不十分な場合には、1 回 80mg を 2 週間隔で皮下投与できる。