

薬剤部からのお知らせ 2019 No.23



2019年9月6日発行

医薬品の採用・中止・変更について —2019年9月5日薬事委員会結果報告—

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	(内)：院内専用医薬品	薬品分類
グラクティブ錠 25mg (シタグリプチンリン酸塩水和物)		血糖降下剤 (選択的 DPP-4 阻害)
タリージェ錠 5mg (ミロガバリンベシル酸塩)		末梢性神経障害性疼痛治療剤
デベルザ錠 20mg (トホグリフロジン水和物)		血糖降下剤 (SGLT2 阻害)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒		漢方製剤
レブラミドカプセル 5mg (レナリドミド水和物) (内)		抗造血器悪性腫瘍剤
テリルジー100 エリプタ 30 吸入用 (フルチカゾンフランカルボン酸エステル、ウメクリジニウム臭化物、ビランテロールトリフェニル酢酸塩)		COPD 治療配合剤
ザバクサ配合点滴静注用 (タゾバクタムナトリウム、セフトロザン硫酸塩)		抗生物質製剤

⇒ 2019年9月18日より処方開始の予定です。

②製剤変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名	薬品分類
組織培養不活化狂犬病ワクチン ⇒ ラビピュール筋注用 (乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン)	ウイルスワクチン類

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

③院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ザファテック錠 100mg (トレラグリプチンコハク酸塩)	血糖降下剤 (選択的 DPP-4 阻害)
タルセバ錠 100mg (エルロチニブ塩酸塩)	抗悪性腫瘍剤 (EGFR 阻害)
タルセバ錠 150mg (エルロチニブ塩酸塩)	抗悪性腫瘍剤 (EGFR 阻害)
ボグリボース OD 錠 0.3mg 「トーワ」 (ボグリボース)	糖尿病食後過血糖改善剤
グランシリンジ 75mg (フィルグラスチム)	G-CSF 製剤
グランシリンジ 150mg (フィルグラスチム)	G-CSF 製剤
グランシリンジ M300mg (フィルグラスチム)	G-CSF 製剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第中止とします。

④院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
グルベス配合錠（ミチグリニドカルシウム水和物、ボグリボース）	糖尿病治療配合剤
コレバインミニ 83%（コレステミド）	高コレステロール血症治療剤
ノリトレン錠 10mg（ノルトリプチリン塩酸塩）	情動調整剤
プレジコビックス配合錠（ダルナビルエタノール付加物、コビススタット）	HIV 感染症治療剤
フルナーゼ点鼻液 50μg 56 噴霧用（フルチカゾンプロピオン酸エステル）	アレルギー性鼻炎治療剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を 2019 年 12 月 31 日とします。

⑤販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ジフラルクリーム 0.05%（ジフロラゾン酢酸エステル）	副腎皮質ホルモン剤
ジフラル軟膏 0.05%（ジフロラゾン酢酸エステル）	副腎皮質ホルモン剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止とします。

⑥適応追加に伴う製剤変更医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ビクトーザ皮下注 18mg（リラグルチド）	糖尿病治療剤

⇒ 在庫がなくなり次第、変更とします。

⑦誤接続防止対応規格の追加

医薬品名(成分名)	薬品分類
塩酸メピバカイン注シリンジ 1%「NP」（メピバカイン塩酸塩）	硬膜外麻酔・伝達麻酔

【院内新規試用医薬品】

(シタグリプチンリン酸塩水和物)

▶グラクティブ錠 25mg

Glactiv 25mg/錠 [小野]

〔薬価〕71.2 円/錠

【効】2 型糖尿病

【用】(内)50mg を 1 日 1 回投与する。効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら 100mg1 日 1 回まで増量することができる。

(ミロガバリンベシル酸塩)

▶タリージェ錠 5mg

Tarlige 5mg/錠 [第一三共]

〔薬価〕107.7 円/錠

【効】末梢神経障害性疼痛

【用】(内)初期用量 1 回 5mg を 1 日 2 回投与し、その後 1 回用量として 5mg ずつ 1 週間以上の間隔をあけて漸増し、1 回 15mg を 1 日 2 回投与する。年齢、症状により 1 日 10mg から 15mg の範囲で適宜増減し、1 日 2 回投与する。

(トホグリフロジン水和物)

▶デベルザ錠 20mg

Deberza 20mg/錠 [興和]

〔薬価〕199.1 円/錠

【効】2 型糖尿病

【用】(内)20mg を 1 日 1 回朝食前又は朝食後に投与する。

▶ツムラ麻子仁丸エキス顆粒

(配合剤) 2.5g/包 [ツムラ]

〔薬価〕6.7 円/g

7.5g 中下記の割合の乾燥エキス 2.5g(マシニン 5g、ダイオウ 4g、キジツ 2g、キョウニン 2g、コウボク 2g、シャクヤク 2g)

【効】便秘

【用】(内)1 日 7.5g を 2～3 回に分割し、食前又は食間に投与する。

(レナリドミド水和物)

▶レブラミドカプセル 5mg

Revlimid 5mg/Cp [セルジーン] ⑧

〔薬価〕9,339.5 円/Cp

【効】①多発性骨髄腫 ②5 番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異型性症候群 ③再発又は難治性の成人 T 細胞白血病リンパ腫

【用】(内)①デキサメタゾンとの併用において、1 日 1 回 25mg を 21 日間連日投与した後、7 日間休薬する。これを 1 サイクルとして投与を繰り返す。②1 日 1 回 10mg を 21 日間連日投与した後、7 日間休薬する。これを 1 サイクルとして投与を繰り返す。③1 日 1 回 25mg を連日投与する。

▶テリルジー100 エリプタ 30 吸入用

Trelegy (配合剤) 30 吸入/個 [グラクソ]

1 ブリスター中：
フルチカゾンフランカルボン酸エステル 100μg
ウメクリジニウム 62.5μg
ビランテロール 25μg

〔薬価〕8,692.8 円/キット

【効】慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎・肺水腫）の諸症状の緩解（吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入 β_2 刺激剤の併用が必要な場合）

【用】(外)1 吸入を 1 日 1 回投与する。

▶ザバクサ配合点滴静注用

Zerbaxa (配合剤) 1.5g/瓶 [MSD]

1 バイアル中：
タゾバクタム 500mg
セフトロザン 1,000mg

〔薬価〕6,335 円/瓶

【効】膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、腹腔内腫瘍、胆嚢炎、肝腫瘍

【用】(注)1 回 1.5g を 1 日 3 回 60 分かけて点滴静注する。腹膜炎、腹腔内腫瘍、胆嚢炎、肝腫瘍に対してはメトロニダゾール注射液と併用すること。

【製剤変更医薬品】

(乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン)

▶ラビピュール筋注用

Ⓔ

Rabipur

〔グラクソ〕

〔薬価〕11,867 円/瓶

【効】狂犬病の予防及び発病阻止

【用】(注)添付の溶剤に全量で溶解し、次のとおり使用する。①曝露前免疫：1.0mL を 1 回量として、適切な間隔をおいて 3 回筋肉内に接種する。②曝露後免疫：1.0mL を 1 回量として、適切な間隔をおいて 4～6 回筋肉内に接種する。

【適応追加に伴う製剤変更医薬品】

(リラグルチド)

▶ビクトーザ皮下注用 18mg

Ⓔ

Victoza 18mg/3mL/キット

〔ノボ〕

〔薬価〕10,245 円/キット

【効】2 型糖尿病

【用】(注)0.9mg を維持用量とし、1 日 1 回朝又は夕に皮下注射する。1 日 1 回 0.3mg から開始し、1 週間以上の間隔で 0.3mg ずつ増量する。1 日 0.9mg で効果不十分な場合には、1 週間以上の間隔で 0.3mg ずつ最高 1.8mg まで増量できる。