

薬剤部からのお知らせ 2019 No.39



2019年12月6日発行

医薬品の採用・中止・変更について —2019年12月5日薬事委員会結果報告—

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アジレクト錠 1mg (ラサギリンメシル酸塩)	パーキンソン病治療剤
ミネブロ錠 2.5mg (エサキセレン)	高血圧治療剤
ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g (ラクツロース)	腸管機能改善剤
キシロカイン注シリンジ 1% (リドカイン)	局所麻酔剤
コアベータ静注用 12.5mg (ランジオロール塩酸塩)	不整脈用剤
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス (デュラグルチド)	糖尿病治療剤
メソトレキセート点滴静注液 1000mg (メソトレキサート)	代謝拮抗剤

⇒ 2019年12月18日より処方開始の予定です。

②製剤変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名	(外): 院外専用医薬品	薬品分類
アカルボース錠 50mg 「ファイザー」 ⇒ グルコバイ錠 100mg (アカルボース)	(外)	食後過血糖改善剤
アダラートカプセル 5mg ⇒ ニフェジピンカプセル 5mg 「サワイ」 (ニフェジピン)	(外)	冠血管拡張剤
アダラートカプセル 10mg ⇒ ニフェジピンカプセル 10mg 「サワイ」 (ニフェジピン)		冠血管拡張剤
サムスカ錠 7.5mg ⇒ サムスカ OD 錠 7.5mg (トルバプタン)		利尿剤 (V2-受容体拮抗剤)
サムスカ錠 15mg ⇒ サムスカ OD 錠 15mg (トルバプタン)		利尿剤 (V2-受容体拮抗剤)
ビタミンE錠 50mg 「NP」 ⇒ ユベラ錠 50mg (トコフェロール酢酸エステル)		ビタミン E 剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

③院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル 40mg「日医工」 (ニカルジピン)	高血圧治療剤
硫酸ポリミキシン B 錠 100 万単位「ファイザー」 (ポリミキシン B 硫酸塩)	ポリペプチド系抗生剤
ファロムドライシロップ小児用 10% (ファロペネム)	ペネム系抗生剤
ブロメライン軟膏 5 万単位/g (ブロメライン)	壊死組織除去剤
ボンアルファハイローション 20µg/g (タカルシトール)	尋常性乾癬治療剤
アキネトン注射液 5mg (ビペリデン)	パーキンソン病治療剤
カドサイラ点滴静注用 100mg (トラスツズマブエムタンシン)	抗悪性腫瘍剤 (乳癌)
カドサイラ点滴静注用 160mg (トラスツズマブエムタンシン)	抗悪性腫瘍剤 (乳癌)
ノボラピッド 70 ミックス注フレックスペン 300 単位 (インスリンアスパルト)	インスリン製剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第中止とします。

④院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
シプロキサシ 錠 100mg (シプロフロキサシン塩酸塩水和物)	ニューキノロン系抗菌製剤
スオード錠 100mg (プルリフロキサシン)	ニューキノロン系抗菌製剤
セレナール錠 5mg (オキサゾラム)	精神科用剤／抗不安薬
セレナール錠 10mg (オキサゾラム)	精神科用剤／抗不安薬
セロケン錠 20mg (メトプロロール酒石酸塩)	高血圧・狭心症・不整脈治療剤 (β遮断剤)
テノーミン錠 50 (アテノロール)	高血圧・狭心症・不整脈治療剤 (β遮断剤)
ポラキス錠 2mg (オキシブチニン塩酸塩)	神経因性膀胱治療剤
メンドンカプセル 7.5mg (クロラゼパ酸二カリウム)	精神科用剤／抗不安薬
アドエア 125 エアゾール 120 吸入用 (サルメテロールキシナホ酸、フルチカゾンプロピオン酸エステル)	喘息治療配合剤
イノレット 30R 注 (インスリンヒト)	混合型インスリン製剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を 2020 年 3 月 31 日とします。

⑤販売中止医薬品

医薬品名(成分名)	(外):院外専用医薬品	薬品分類
アドフィードバップ 80mg (フルルビプロフェン) (外)		鎮痛消炎貼付剤
ガストロゼピン錠 25mg (ピレンゼピン) (外)		消化性潰瘍治療薬
ビオラクチス散 (カゼイ菌) (外)		乳酸菌製剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止とします。

【院内新規試用医薬品】

(ラサギリンメシル酸塩錠)

▶アジレクト錠 1mg

Azilect 1mg/錠 [武田]

〔薬価〕963.9 円/錠

【効】パーキンソン病

【用】(内)1mg を 1 日 1 回投与する。

(エサキセレノン)

▶ミネブロ錠 2.5mg

Minnebro 2.5mg/錠 [第一三共]

〔薬価〕91.6 円/錠

【効】高血圧症

【用】(内)2.5mg を 1 日 1 回投与する。効果不十分な場合、5mg まで増量することができる。

(ラクツロース)

▶ラグノス NF 経口ゼリー分包 12g

Lagnos 12g/包 [三和化学]

〔薬価〕45.5 円/包

【効】①慢性便秘症 ②高アンモニア血症に伴う次記症候の改善 精神神経障害、手指振戦、脳波異常 ③産婦人科術後の排ガス・排便の促進

【用】(内)①2 包を 1 日 2 回投与する。1 日最高用量は 6 包までとする。②1～2 包を 1 日 3 回投与する。

③1～3 包を 1 日 2 回投与する。

(キシロカイン)

▶キシロカイン注シリンジ 1% (劇)

Xylocaine 10mg/mL [アスペン]

〔薬価〕196 円/本

【効】硬膜外麻酔、伝達麻酔、浸潤麻酔、表面麻酔

【用】(注)1 回 20mL を基準最高用量とする。

(ランジオロール塩酸塩)

▶コアベータ 静注用 12.5mg (劇)

Corebeta 12.5mg/V [小野]

〔薬価〕2,759 円/V

【効】コンピューター断層撮影による冠動脈造影における高心拍数時の冠動脈描出能の改善

【用】(注) 1 回 0.125mg/kg を 1 分間で静脈内投与する。

(デュラグルチド)

▶トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス (劇)

Trulicity 0.75mg/キット [イーライリリー]

〔薬価〕3,419 円/キット

【効】2 型糖尿病

【用】(注) 0.75mg を週に 1 回、皮下投与する。

(メトトレキサート)

▶メソトレキセート点滴静注液 1000mg (劇)

Methotrexate 1000mg/V [ファイザー]

〔薬価〕36,991 円/V

〔貯法〕遮光

【効】メトトレキサート・ロイコボリン救援療法：

①肉腫 ②急性白血病の中樞神経系及び睾丸への心中に対する寛解 ③悪性リンパ腫の中樞神経系への浸潤に対する寛解

【用】(注)①1 週間に 1 回 100～300mg/kg を約 6 時間で点滴静脈内投与する。その後、ロイコボリンの投与を行う。メトトレキサートの投与間隔は 1～4 週間とする。②③1 週間に 1 回 30～100mg/kg を約 6 時間で点滴静脈内投与する。その後、ロイコボリンの投与を行う。メトトレキサートの投与間隔は 1～4 週間とする。

【製剤変更医薬品】

(アカルボース)

▶グルコバイ錠 100mg

Glucobay 100mg/錠 [バイエル]

〔薬価〕31.8 円/錠

【効】糖尿病の食後過血糖の改善

【用】(内) 1 回 100mg を 1 日 3 回食直前に投与する。

1 回 50mg より投与を開始し、忍容性を確認したうえで 1 回 100mg へ増量することもできる。

(トコフェロール酢酸エステル)

▶ユベラ錠 50mg

Juvela 50mg/錠 [エーザイ]

〔薬価〕5.7 円/錠

【効】ビタミン E 欠乏症の予防及び治療、末梢循環障害、過酸化脂質の増加防止

【用】(内) 1 回 50～100mg を 1 日 2～3 回投与する。

(ニフェジピン)

▶ニフェジピンカプセル 5mg 「サワイ」 (劇)

Nifedipine 5mg/Cp [沢井]

〔薬価〕5.7 円/Cp

▶ニフェジピンカプセル 10mg 「サワイ」 (劇)

Nifedipine 10mg/Cp

〔薬価〕5.7 円/錠

【効】本態性高血圧症、腎性高血圧症、狭心症

【用】(内) 1 回 10mg を 1 日 3 回投与する。

(トルバプタン)

▶サムスカ OD 錠 7.5mg (劇)

Samsca 7.5mg/錠 [大塚]

〔薬価〕1,298.5 円/錠

▶サムスカ OD 錠 15mg (劇)

Samsca 15mg/錠

〔薬価〕1,975.4 円/錠

【効】①ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 ②ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な肝硬変における体液貯留 ③ (7.5mg のみ) 腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制

【用】(内) ①15mg を 1 日 1 回投与する。②7.5mg を 1 日 1 回投与する。③1 日 60mg を 2 回 (朝 45mg、夕 15mg) に分けて投与を開始する。1 日 60mg の用量で 1 週間以上投与し、忍容性がある場合、1 日 90mg (朝 60mg、夕 30mg)、1 日 120mg (朝 90mg、夕方 30mg) と 1 週間以上の間隔を空けて段階的に増量する。最高用量は 1 日 120mg までとする。