

薬剤部からのお知らせ2020 No.1



2020年1月7日発行

院外処方医薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

2020 年 1 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
エクフィナ錠 50mg(サフィナミドメシル酸塩)	パーキンソン病治療剤
コララン錠 2.5mg(イバブラジン塩酸塩)	慢性心不全治療剤
コララン錠 5mg(イバブラジン塩酸塩)	慢性心不全治療剤
トリンテリックス錠 10mg(ボルチオキセチン臭化水素酸塩)	抗うつ剤
トリンテリックス錠 20mg(ボルチオキセチン臭化水素酸塩)	抗うつ剤
アイベータ配合点眼液(ブリモニジン酒石酸塩、チモロールマレイン酸塩)	緑内障・高眼圧症治療剤
アレジオン LX 点眼液 0.1%(エピナスチン塩酸塩)	抗アレルギー点眼剤
ハルロピテプ 8mg(ロピニロール塩酸塩)	パーキンソン病治療剤
ハルロピテプ 24mg(ロピニロール塩酸塩)	パーキンソン病治療剤
ハルロピテプ 32mg(ロピニロール塩酸塩)	パーキンソン病治療剤

(サフィナミドメシル酸塩)

▶エクフィナ錠 50mg (劇)

Equfina 50mg/錠 [エーザイ]

〔薬価〕963.9 円/錠

【効】レボドパ含有製剤で治療中のパーキンソン病における wearing off 現象の改善

【用】(内)レボドパ含有製剤と併用する。50mg を 1 日 1 回投与する。

(イバブラジン塩酸塩)

▶コララン錠 2.5mg (劇)

Coralan 2.5mg/錠 [小野]

〔薬価〕82.9 円/錠

▶コララン錠 5mg (劇)

Coralan 5mg/錠

〔薬価〕145.4 円/錠

【効】洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が 75 回/分以上の慢性心不全 (β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る)

【用】(内) 1 回 2.5mg を 1 日 2 回投与から開始する。忍容性をみながら、目標とする安静時心拍数が維持

できるように、必要に応じ、2 週間以上の間隔で段階的に用量を増減する。1 回投与量は 2.5、5 又は 7.5mg のいずれかとし、いずれの投与量においても、1 日 2 回投与とする。

(ボルチオキセチン臭化水素酸塩)

▶トリンテリックス錠 10mg (劇)

Trintellix 10mg/錠 [武田]

〔薬価〕168.9 円/錠

▶トリンテリックス錠 20mg (劇)

Trintellix 20mg/錠

〔薬価〕253.4 円/錠

【効】うつ病・うつ状態

【用】(内)10mg を 1 日 1 回投与する。患者の状態により 1 日 20mg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は 1 週間位以上の間隔をあけて行うこと。

▶アイベータ配合点眼液

Aibeta (配合剤)	[千寿]
1mL 中：	
ブリモニジン酒石酸塩	1mg
チモロールマレイン酸塩	6.8mg

〔薬価〕456 円/mL

【効】次の疾患で他の緑内障治療薬が効果不十分な場合：緑内障、高眼圧症

【用】(外) 1 回 1 滴、1 日 2 回点眼する。

(エピナスチン塩酸塩)

▶アレジオン LX 点眼液 0.1%

Alesion LX 5mL/本 [参天]

〔薬価〕712.6 円/mL

【効】アレルギー性結膜炎

【用】(外) 1 回 1 滴、1 日 2 回点眼する。

(ロピニロール塩酸塩)

▶ハルロピテープ 8mg (劇)

Haruropi 8mg/枚 [協和]

〔薬価〕404.9 円/枚

▶ハルロピテープ 24mg (劇)

Haruropi 24mg/枚

〔薬価〕801.5 円/枚

▶ハルロピテープ 32mg (劇)

Haruropi 32mg/枚

〔薬価〕958.4 円/枚

【効】パーキンソン病

【用】(外) 1 日 1 回 8mg から始め、以後経過を観察しながら、必要に応じて 1 週間以上の間隔で、1 日量として 8mg ずつ増量する。いずれの投与量の場合も 1 日 1 回、胸部、腹部、側腹部、大腿部又は上腕部のいずれかの皮膚に貼付し、24 時間毎に貼り替える。1 日量 64mg を超えないこと。