薬剤部からのお知らせ 2019 No.29

2020年9月8日発行

医薬品の採用・中止・変更について -2020年9月3日薬事委員会結果報告-

①院内新規試用医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
エンレスト錠 100mg(サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物)	慢性心不全治療剤
オンジェンティス錠 25mg(オピカポン)	パーキンソン病治療剤
トリンテリックス錠 10mg(ボルチオキセチン臭化水素酸塩)	抗うつ剤
ロケルマ懸濁用散分包 5g(ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物)	高カリウム血症治療剤
PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL(ポリビニルアルコール、ヨウ素)	洗眼殺菌剤
ダラザレックス点滴静注 100mg(ダラツムマブ)	抗悪性腫瘍剤
ダラザレックス点滴静注 400mg(ダラツムマブ)	抗悪性腫瘍剤
ルムジェブ注ミリオペンHD(インスリンリスプロ)	インスリン製剤

⇒ 2020年9月15日より処方開始の予定です。

②製剤変更医薬品

変更前医薬品名 ⇒ 変更後医薬品名	薬品分類
ヒューマログ注ミリオペン ⇒ インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」	インスリン製剤
ビムパット点滴静注 200mg ⇒ ビムパット点滴静注 100mg	抗てんかん剤
フォルテオ皮下注キット 600 μ g ⇒ テリパラチド BS 皮下注キット 600 μ g「モチダ」	骨粗鬆症治療剤

⇒ 旧製剤の在庫がなくなり次第、変更とします。

③院内採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アルケラン錠 2mg(メルファラン)	抗悪性腫瘍剤
カリエードプラス散(分包)96.7% (ポリスチレンスルホン酸カルシウム)	高カリウム血症治療剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム散 10%「日医工」 (カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム)	止血剤
トレドミン錠 25mg(ミルナシبران塩酸塩)	セロトニン・ノルアドレナリン再 取り込み阻害剤
ルジオミール錠 10mg(マプロチリン塩酸塩)	四環系抗うつ剤
アピドラ注ソロスター(インスリングルリジン)	インスリン製剤
キシロカイン注ポリアンプ 0.5% 10mL(リドカイン)	局所麻酔剤

⇒ 院内の在庫がなくなり次第中止とします。

④院外採用中止医薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
イブランスカプセル 25mg(パルボシクリブ)	抗悪性腫瘍剤
イブランスカプセル 125mg(パルボシクリブ)	抗悪性腫瘍剤
ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒	漢方製剤
セロクエル 25mg 錠(クエチアピンプマル酸)	抗精神病剤
セロクエル 100mg 錠(クエチアピンプマル酸)	抗精神病剤
タフィンラーカプセル 50mg(ダブラフェニブメシル酸塩)	抗悪性腫瘍剤
ドラール錠 15mg(クアゼパム)	ベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤
パナルジン錠 100mg(チクロピジン塩酸塩)	抗血小板剤
ベシカムクリーム 5%(イブプロフェンピコノール)	非ステロイド性鎮痛消炎剤
メキニスト錠 0.5mg(トラメチニブ)	抗悪性腫瘍剤
リスミー錠 1mg(リルマザホン塩酸塩水和物)	ベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤
エスケレ坐剤 250mg(抱水クロラール)	催眠・鎮静剤
エスケレ坐剤 500mg(抱水クロラール)	催眠・鎮静剤
ミケラン点眼液 1%(カルテオロール塩酸塩)	緑内障治療剤

⇒ 在庫がなくなり次第中止としますが、最終を 2020 年 12 月 31 日とします。

【院内新規試用医薬品】

(サクビトリルバルサルタン水和物)

▶エンレスト錠 100mg

Entresto 100mg/錠 [ノバルティス]

〔薬価〕115.2 円/錠

【効】慢性心不全(ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る)

【用】(内) 1回 50mg を開始用量として1日2回投与する。2~4週間の間隔で段階的に1回200mgまで増量する。1回投与量は50mg、100mg又は200mgとし1日2回投与する。

(オピカポン)

▶オンジェンティス錠 25mg

Ongentys 25mg/錠 [小野]

〔薬価〕972 円/錠

【効】レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off 現象)の改善

【用】(内) 25mg を1日1回、レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩の投与前後及び食事の前後1時間以上あけて投与する。

(ボルチオキセチン臭化水素酸塩)

▶トリンテリックス錠 10mg

Trintellix 10mg/錠 [武田]

〔薬価〕168.9 円/錠

【効】うつ病・うつ状態

【用】(内) 10mg を1日1回投与する。患者の状態により1日20mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて行うこと。

(ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物)

▶ロケルマ懸濁用散分包 5g

Lokelma 5g/包 [アストラゼネカ]

〔薬価〕1,095.2 円/包

【効】急性及び慢性腎不全に伴う高カリウム血症

【用】(内) 開始用量として1回10gを水で懸濁して1日3回、2日間投与する。最長3日間まで投与できる。以後は、1回5gを水で懸濁して1日1回投与する。最高用量は1日1回15gまでとする。

血液透析施行中の場合には、通常、1回5gを水で懸濁して非透析日に1日1回投与する。最高用量は1日

1回15gまでとする。

▶PA・ヨード点眼・洗眼液

PA・IODO (0.2%) 20mL/本 [日本点眼薬]

〔薬価〕22.5 円/mL

【貯法】冷所

1本(20mL)中:

ヨウ素	40mg
ポリビニルアルコール	1600mg

【効】角膜ヘルペス、洗眼殺菌

【用】(外) 生理食塩液で4~8倍に希釈して用いる。

(ダラツムマブ(遺伝子組換え))

▶ダラザレックス点滴静注 100mg

Darzalex 100mg/5mL/V [ヤンセン]

〔薬価〕52,262 円/瓶

▶ダラザレックス点滴静注 400mg

Darzalex 400mg/20mL/V

〔薬価〕187,970 円/瓶

【貯法】遮光、2~8℃

【効】多発性骨髄腫

【用】(注) 他の抗悪性腫瘍剤との併用において、1回16mg/kgを、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、以下のA法又はB法の投与間隔で点滴静注する。

A法:1週間間隔、2週間間隔及び4週間間隔の順で投与する。

B法:1週間間隔、3週間間隔及び4週間間隔の順で投与する。

(インスリン リスプロ(遺伝子組換え))

▶ルムジェブ注ミリオペンHD

Lyumjev 300単位/3mL/本 [日本イーライリリー]

〔薬価〕1,400 円/キット

【貯法】禁凍結、2~8℃

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病

【用】(注) 1回2~20単位を毎食事開始時に皮下注射するが、必要な場合は食事開始後の投与とすることもできる。維持量としては1日4~100単位である。

【製剤変更医薬品】

(インスリンリスプロ(遺伝子組換え)) ⑥

▶インスリンリスプロ BS 注ソロスターHU「サノフィ」300 単位

Insulin Lispro 300 単位/3mL/本 [サノフィ]

【薬価】1,258 円/キット

【貯法】遮光、2～8℃

【効】インスリン療法が適応となる糖尿病

【用】(注) 1 回 2～20 単位を毎食直前に皮下注するが、ときに投与回数を増やしたり、持続型インスリン製剤と併用したりすることがある。持続型インスリン製剤の投与量を含めた維持量は 1 日 4～100 単位である。

(ラコサミド)

▶ビムパット点滴静注 100mg ⑥

Vimpat 100mg/V [第一三共]

【薬価】2,459 円/瓶

【効】一時的に経口投与ができない患者における、下記の治療に対するラコサミド経口製剤の代替療法:てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)

【用】(注) ラコサミドの経口投与から本剤に切り替える場合: ラコサミド経口投与と同じ 1 日用量及び投与回数にて、1 回量を 30 分から 60 分かけて点滴静脈内投与する。

ラコサミドの経口投与に先立ち本剤を投与する場合:

〔成人〕1 日 100mg より投与を開始し、その後 1 週間以上の間隔をあけて増量し、維持用量を 1 日 200mg とするが、いずれも 1 日 2 回に分け、1 回量を 30 分から 60 分かけて点滴静脈内投与する。症状により 1 日 400mg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 100mg 以下ずつ行う。

〔小児〕4 歳以上の小児には 1 日 2mg/kg より投与を開始し、その後 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 2mg/kg ずつ増量し、維持用量を 30kg 未満の小児には 1 日 6mg/kg、30kg 以上 50kg 未満の小児には 1 日 4mg/kg とする。いずれも 1 日 2 回に分け、1 回量を 30 分から 60 分かけて点滴静脈内投与する。4 歳以上の小児のうち 30kg 未満の小児には 1 日 12mg/kg、30kg 以上 50kg 未満の小児には 1 日 8mg/kg を超えない範囲で適宜増減するが、増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 2mg/kg 以下ずつ行う。50kg 以上の小児では、成人と同じ用法・用量を用いること。

(テリパラチド(遺伝子組換え))

⑥

▶テリパラチド BS 皮下注キット 600 μ g「モチダ」

Teriparatide BS /2.4mL/本 [持田]

【薬価】25,643 円/キット

【貯法】遮光、2～8℃

【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】(注) 1 日 1 回 20 μ g を皮下注射する。本剤の投与は 24 ヶ月間までとすること。