

薬剤部からのお知らせ 2020 No.35



2020年10月6日発行

院外処方薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

2020 年 10 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ダーブロック錠 2mg (ダプロデュスタット)	腎性貧血治療剤
ダーブロック錠 4mg (ダプロデュスタット)	腎性貧血治療剤
アテキュラ吸入用カプセル高用量 (インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル)	気管支喘息治療剤
エナジア吸入用カプセル中用量 (インダカテロール酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル)	気管支喘息治療剤
エナジア吸入用カプセル高用量 (インダカテロール酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル)	気管支喘息治療剤

(ダプロデュスタット)

▶ダーブロック錠 2mg

劇

Duvroq 2mg/錠

〔協和キリン〕

〔薬価〕185.8 円/錠

▶ダーブロック錠 4mg

劇

Duvroq 4mg/錠

〔薬価〕327.4 円/錠

【効】腎性貧血

【用】(内) ○保存期慢性腎臓病患者：

(赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合)

1 回 2mg 又は 4mg を開始用量とし、1 日 1 回投与する。

最高用量は 1 日 1 回 24mg までとする。

(赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合)

1 回 4mg を開始用量とし、1 日 1 回投与する。最高用量は 1 日 1 回 24mg までとする。

○透析患者：1 回 4mg を開始用量とし、1 日 1 回投与する。最高用量は 1 日 1 回 24mg までとする。

▶アテキュラ吸入用カプセル高用量

Aectura

〔ノバルティス〕

〔薬価〕192.2 円/Cp

1 カプセル中：

インダカテロール酢酸塩 150μg

モメタゾンフランカルボン酸エステル 320μg

【効】気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作用性吸入β2 刺激剤の併用が必要な場合)

【用】(外) 低用量 1 回 1 カプセルを 1 日 1 回本剤専用の

吸入器具を用いて吸入する。症状に応じて中用量・高用量の 1 回 1 カプセルを 1 日 1 回本剤専用の吸入器具を用いて吸入する。

▶エナジア吸入用カプセル中用量

Enerzair

〔ノバルティス〕

〔薬価〕291.9 円/Cp

1 カプセル中：

インダカテロール酢酸塩 150μg

グリコピロニウム臭化物 50μg

モメタゾンフランカルボン酸エステル 80μg

▶エナジア吸入用カプセル高用量

Enerzair

〔薬価〕333.4 円/Cp

1 カプセル中：

インダカテロール酢酸塩 150μg

グリコピロニウム臭化物 50μg

モメタゾンフランカルボン酸エステル 160μg

【効】気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入β2 刺激剤及び長時間作用性吸入抗コリン剤の併用が必要な場合)

【用】(外) 中用量 1 回 1 カプセルを 1 日 1 回本剤専用の吸入器具を用いて吸入する。症状に応じて高用量 1 回 1 カプセルを 1 日 1 回本剤専用の吸入器具を用いて吸入する。