

薬剤部からのお知らせ 2020 No.42



2020年12月10日発行

医薬品の院外採用について - 2020年12月7日薬事委員会 WG 結果報告 -

2020年12月15日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
ジセレカ錠 100mg(フィルゴチニブマレイン酸塩)	関節リウマチ治療剤
ジセレカ錠 100mg(フィルゴチニブマレイン酸塩)	関節リウマチ治療剤
ゼジュラカプセル 100mg(ニラパリプトシル酸塩水和物)	抗悪性腫瘍剤
ブコラム口腔用液 2.5mg(ミダゾラム)	てんかん治療剤
ブコラム口腔用液 5mg(ミダゾラム)	てんかん治療剤
ブコラム口腔用液 7.5mg(ミダゾラム)	てんかん治療剤
ブコラム口腔用液 10mg(ミダゾラム)	てんかん治療剤

院外処方薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

(フィルゴチニブマレイン酸塩)

▶ ジセレカ錠 100mg

㊟

Jyseleca 100mg/錠

〔エーザイ〕

〔薬価〕2,550.9 円/錠

▶ ジセレカ錠 200mg

㊟

Jyseleca 200mg/錠

〔薬価〕4,972.8 円/錠

【効】既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)

【用】(内) 200mg を 1 日 1 回投与する。患者の状態に応じて 100mg を 1 日 1 回投与できる。

(ニラパリプトシル酸塩水和物)

▶ ゼジュラカプセル 100mg

㊟

Zejula 100mg/錠

〔武田〕

〔薬価〕10,370.2 円/Cp

〔貯法〕2~8℃

【効】○卵巣癌における初回化学療法後の維持療法

○白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法

○白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修復欠損を有する再発卵巣癌

【用】(内) 1 日 1 回 200mg を投与する。ただし、本剤初回投与前の体重が 77kg 以上かつ血小板数が 150,000/ μ L 以上では 1 日 1 回 300mg を投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

(ミダゾラム)

▶ ブコラム口腔用液 2.5mg

㊟

Buccolam 2.5mg/0.5mL/筒

〔武田〕

〔薬価〕1,125.8 円/筒

▶ ブコラム口腔用液 5mg

㊟

Buccolam 5mg/1mL/筒

〔薬価〕1,977.8 円/筒

▶ ブコラム口腔用液 7.5mg

㊟

Buccolam 7.5mg/1.5mL/筒

〔薬価〕2,750 円/筒

▶ ブコラム口腔用液 10mg

㊟

Buccolam 10mg/2mL/筒

〔薬価〕3,474.6 円/筒

【効】てんかん重積状態

【用】(内) 修正在胎 52 週(在胎週数+出生後週数)以上 1 歳未満の患者には 1 回 2.5mg、1 歳以上 5 歳未満の患者には 1 回 5mg、5 歳以上 10 歳未満の患者には 1 回 7.5mg、10 歳以上 18 歳未満の患者には 1 回 10mg を頬粘膜投与する。