

薬剤部からのお知らせ 2021 No.06

2021年2月3日発行



医薬品の院外採用について -2021年2月1日薬事委員会 WG 結果報告-

2021年2月16日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
イスパロクト静注用 3000(ツロクトコグアルファペゴル)	血液凝固第Ⅷ因子製剤
リベルサス錠 3mg(セマグルチド)	2型糖尿病治療剤
リベルサス錠 7mg(セマグルチド)	2型糖尿病治療剤
リベルサス錠 14mg(セマグルチド)	2型糖尿病治療剤
レパーサ皮下注 140mg ペン(エボロクマブ)	高コレステロール血症治療剤

院外処方薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

(ツロクトコグアルファペゴル(遺伝子組換え))

▶イスパロクト静注用 3000

Esperoct 3,000 国際単位/V [ノボノルディスク]

[薬価]329,913 円/瓶

[貯法]2~8℃

【効】血液凝固第Ⅷ因子欠乏患者における出血傾向の抑制

【用】(注) 本剤を添付の専用溶解液全量で溶解し、1~2mL/分で緩徐に静脈内に注射する。1回体重1kg当たり10~30国際単位を投与する。

定期的に投与する場合、12歳以上の患者には、1回体重1kg当たり50国際単位を4日毎に投与する。1回体重1kg当たり50国際単位を週2回、又は1回体重1kg当たり75国際単位を週1回投与することもできる。

12歳未満の小児には、1回体重1kg当たり60国際単位を週2回投与する。1回体重1kg当たり50~75国際単位を週2回又は3日毎に投与することもできる。

(セマグルチド(遺伝子組み換え))

▶リベルサス錠 3mg

劇

Rybelsus 3mg/錠 [ノボノルディスク]

[薬価]143.2 円/錠

▶リベルサス錠 7mg

劇

Rybelsus 7mg/錠 [ノボノルディスク]

[薬価]334.2 円/錠

▶リベルサス錠 14mg

劇

Rybelsus 14mg/錠 [ノボノルディスク]

[薬価]501.3 円/錠

【効】2型糖尿病

【用】(内) 1日1回7mgを維持用量とし経口投与する。ただし、1日1回3mgから開始し、4週間以上投与した後、1日1回7mgに増量する。なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、1日1回7mgを4週間以上投与しても効果不十分な場合には、1日1回14mgに増量することができる。

(エボロクマブ(遺伝子組換え))

▶レパーサ皮下注 140mg ペン

Repatha 140mg/1mL/キット [アステラス]

[薬価]24,344 円/キット

[貯法]遮光、禁凍結、2~8℃

【効】家族性高コレステロール血症、高コレステロール血症(ただし、心血管イベントの発現リスクが高く、HMG-CoA還元酵素阻害剤で効果不十分、又はHMG-CoA還元酵素阻害剤による治療が適さない場合。)

【用】(注) ○家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高コレステロール血症：140mgを2週間に1回又は420mgを4週間に1回皮下投与する。
○家族性高コレステロール血症ホモ接合体：420mgを4週間に1回皮下投与する。効果不十分な場合には420mgを2週間に1回皮下投与できる。LDLアフェレーシスの補助として本剤を使用する場合は、開始用量として420mgを2週間に1回皮下投与することができる。