

薬剤部からのお知らせ

2021 No.27

2021年6月8日発行



院外処方薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテのJUS D.I.を参照して下さい。

2021年6月22日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
マスーレッド錠 12.5mg(モリデュスタットナトリウム)	腎性貧血治療薬
マスーレッド錠 25mg(モリデュスタットナトリウム)	腎性貧血治療薬
エクロックゲル 5%(ソフピロニウム臭化物)	原発性腋窩多汗症治療剤
コレクチム軟膏 0.25%(デルゴシチニブ)	アトピー性皮膚炎治療剤
ヌーカラ皮下注 100mg ペン(メポリズマブ)	気管支喘息・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症治療剤

(モリデュスタットナトリウム)

▶マスーレッド錠 12.5mg

劇

Musredo 12.5mg/錠

[バイエル]

[薬価]93.7 円/錠

▶マスーレッド錠 25mg

劇

Musredo 25mg/錠

[薬価]165.1 円/錠

【効】腎性貧血

【用】(注) ○保存期慢性腎臓病患者：(赤血球造血刺激因子製剤で未治療の場合)1回 25mg を開始用量とし、1日1回投与する。最高用量は1回 200mg までとする。

(赤血球造血刺激因子製剤から切り替える場合)1回 25mg または 50mg を開始用量とし、1日1回投与する。最高用量は1回 200mg とする。

○透析患者：1回 75mg を開始用量とし、1日1回投与する。最高用量は1回 200mg とする。

(ソフピロニウム臭化物)

▶エクロックゲル 5%

Ecclock (5%) 20g/本

[科研]

[薬価]243.7 円/g

【効】原発性腋窩多汗症

【用】(外) 適量を腋窩に塗布する。

(デルゴシチニブ)

▶コレクチム軟膏 0.25%

Corectim (0.25%) 5g/本

[鳥居]

[薬価]141.4 円/g

【効】アトピー性皮膚炎

【用】(外) 成人：0.5%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。1回あたりの塗布量は5g までとする。

小児：0.25%製剤を1日2回、適量を患部に塗布する。症状に応じて、0.5%製剤を1日2回塗布することができる。1回あたりの塗布量は5g までとするが、体格を考慮すること。

(メポリズマブ)

▶ヌーカラ皮下注 100mg ペン

劇

Nucala 100mg/キット

[グラクソ]

[薬価]179,269 円/キット

【貯法】禁凍結、遮光、2~8℃

【効】気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)、既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

【用】(注) ○気管支喘息：成人及び12歳以上の小児には1回 100mg を4週間ごとに皮下に注射する。

○好酸球性多発血管炎性肉芽腫症：成人には1回 300mg を4週間ごとに皮下に注射する。