

薬剤部からのお知らせ

2021 No.48

2021年10月5日発行



院外処方薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテの JUS D.I.を参照して下さい。

2021 年 10 月 16 日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
エブリスディドライシロップ 60mg(リスジプラム)	脊髄性筋萎縮症治療剤
テネリア OD 錠 20mg(テネリグリブチン)	糖尿病治療剤
リクシアナ OD 錠 15mg(エドキサバン)	抗凝固剤

(リスジプラム)

▶エブリスディドライシロップ 60mg (劇)

Evrysdi 120mg/瓶 [中外]

〔薬価〕974,463.7 円/瓶

【効】脊髄性萎縮症

【用】(内) 生後 2 ヶ月以上 2 歳未満の患者には、0.2mg/kg を 1 日 1 回食後に投与する。2 歳以上の患者には 0.25mg/kg を、体重 20kg 以上では 5mg を 1 日 1 回食後に投与する。

(テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物)

▶テネリア OD 錠 20mg

Tenelia 20mg/錠 [田辺三菱]

〔薬価〕134.7 円/錠

【効】2 型糖尿病

【用】(内) 20mg を 1 日 1 回投与する。効果不十分な場合には、40mg1 日 1 回に増量することができる。

(エドキサバントシル酸塩水和物)

▶リクシアナ OD 錠 15mg

Lixiana 15mg/錠 [第一三共]

〔薬価〕224.7 円/錠

【効】①非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制

②静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制

③下記の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制: 膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術

【用】(内) ①以下の用量を 1 日 1 回投与する。

60kg 以下: 30mg

60kg 超: 60mg、腎機能、併用薬に応じて 1 日 1 回 30mg に減量する。

出血リスクが高い高齢の患者では、1 日 1 回 15mg に減量できる。

②以下の用量を 1 日 1 回投与する。

60kg 以下: 30mg

60kg 超: 60mg、腎機能、併用薬に応じて 1 日 1 回 30mg に減量する。

③30mg を 1 日 1 回投与する。