



SGLT2阻害薬のオーダーについて

SGLT2阻害薬である「フォシーガ錠10mg」に【慢性腎臓病】、「ジャディアンス錠10mg」に【慢性心不全】の適応が追加となりました。

「フォシーガ錠10mg」に対して、異なる開始用量での適応追加が行われた際に、適応に対する規格間違い・不適切な患者への処方による副作用の発現の増加・どちらの病名に対して使用されているか判断ができない等、医療安全の観点から問題が発生する懸念がありました。安全に使用するため、現在まで処方オーダー名を「【糖尿病】フォシーガ錠10mg」、「【心不全】フォシーガ錠10mg」とオーダーを分けて運用しておりました。

そのため今回、新たな適応追加を受け、同様にオーダー上の名称を分けることとしますので、使用する適応症に応じて選択するようにお願い申し上げます。



【糖尿病】 フォシーガ錠10mg
【心不全】 フォシーガ錠10mg
【慢性腎臓病】 フォシーガ錠10mg

【効能・効果】

- ①2型糖尿病 ②1型糖尿病
- ③慢性心不全(ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。)
- ④慢性腎臓病(ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く。)

【用法・用量】

- ①5mgを1日1回投与する。効果不十分な場合には、10mg1日1回に増量することができる。
- ②インスリン製剤との併用において、5mgを1日1回投与する。効果不十分な場合には、10mg1日1回に増量することができる。
- ③④10mgを1日1回投与する。



【糖尿病】 ジャディアンス錠10mg
【心不全】 ジャディアンス錠10mg

【効能・効果】

- ①2型糖尿病
- ②慢性心不全(ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。)

【用法・用量】

- ①10mgを1日1回朝食前又は朝食後に投与する。効果不十分な場合には、25mg1日1回に増量することができる。
- ②10mgを1日1回朝食前又は朝食後に投与する。

※変更点