

薬剤部からのお知らせ 2024 No.7



2024年3月6日発行

院外処方薬品情報

使用上の注意の詳細については電子カルテのDI参照およびDI検索を参照して下さい。

2024年3月16日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類
アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」(アダリムマブ)	ヒト型抗ヒト TNF α モノクローナル抗体製剤
アダリムマブ BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」(アダリムマブ)	ヒト型抗ヒト TNF α モノクローナル抗体製剤

(アダリムマブ(遺伝子組換え))

▶ アダリムマブ BS 皮下注 40mg ペン 0.4mL「CTNK」 (後側)

40mg/0.4mL/キット

〔薬価〕27,822 円/キット

▶ アダリムマブ BS 皮下注 80mg ペン 0.8mL「CTNK」 (後側)

80mg/0.8mL/キット

〔薬価〕55,109 円/キット

Adalimumab 〔日本化薬〕

〔貯法〕遮光、2～8℃

【効】

①関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)

②既存治療で効果不十分な下記疾患：

(1)尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬

(2)強直性脊椎炎

(3)多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎

(4)腸管型ベーチェット病

(5)非感染性の中関節、後部又は汎ぶどう膜炎

③中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)

④中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)

【用】(注) ①40mg を2週に1回、皮下注する。効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。

②(1)初回に80mgを皮下注し、以後2週に1回、40mgを皮下注する。効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる。

(2)40mgを2週に1回、皮下注する。効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。

(3)15kg以上30kg未満の場合は20mgを、30kg以上の場合には40mgを2週に1回、皮下注する。

(4)初回に160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注する。

(5)初回80mgを、初回投与1週間後に40mgを皮下注射する。初回投与3週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。

③初回に160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注する。効果が減弱した場合には1回80mgに増量できる。

④初回に160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注する。初回投与4週間後以降は、患者の状態に応じて40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回、皮下注することもできる。

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室(内線 7083)までご連絡下さい。

(文責：丹羽今日子)