



経静脈鉄剤の血管外漏出にご注意ください

鉄剤の経静脈投与を行う際は、血管外漏出に十分ご注意ください。漏出した場合、漏出部位周辺に皮膚の炎症や、**長期にわたる色素沈着**が生じることが報告されています。

色素沈着に対する**効果的な治療法は存在せず、漏出しないよう予防することが最大の対策**となります。



PMID: 31714385

鉄剤が血管内に注入され、血管外に漏出していないことを十分に確認してください。漏出により**長期的に色素沈着することがあります**。

【投与時の注意点】

- ✓ 血流が良好で、太く弾力があり、損傷の無い静脈を選択する。
- ✓ 必ず**留置針より投与**する。
- ✓ 逆流を確認する、生理食塩液を用いる等、静脈への開通性を確認する。
- ✓ 患者への説明を十分に行う。
 - ・点滴中は注射部位を動かさないこと
 - ・注射部位の疼痛、腫脹、紅斑、周辺の皮膚が茶色に着色した場合、速やかに申し出ること
- ✓ 点滴開始後、注入部位を注意深く観察し、以降も可能な限り頻回にモニタリングを行う。
 - ・点滴部位に異常(浮腫、紅斑、疼痛、漏出)がないか
 - ・点滴がスムーズに流れない、点滴速度の低下等の異常がないか

【当院採用の経静脈鉄剤】

フェジン静注 40mg	フェインジェクト静注 500mg	モノヴァー静注 500mg
		