

薬剤部からのお知らせ 2024 No.38



2024年9月3日発行

院外処方薬品情報

—2024年9月2日薬事委員会 WG 結果報告—

2024年9月16日開始薬品

医薬品名(成分名)	薬品分類	申請診療科
メトジェクト皮下注 7.5mg ペン 0.15mL(メトトレキサート)	関節リウマチ治療剤	総合内科
メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL(メトトレキサート)	関節リウマチ治療剤	総合内科
ラパリムス顆粒 0.2%(シロリムス)	難治性脈管腫瘍治療剤	小児科
【臨時採用】		
ジクアス点眼液 3%(ジクアホソルナトリウム)	ドライアイ治療剤	眼科

(メトトレキサート)

▶メトジェクト皮下注 7.5mg ペン 0.15mL (劇)

Metobject 7.5mg/0.15mL/1筒 [エーザイ]

〔薬価〕1,938 円/筒

▶メトジェクト皮下注 10mg ペン 0.20mL (劇)

Metobject 10mg/0.25mL/1筒 [エーザイ]

〔薬価〕2,310 円/筒

〔貯法〕禁凍結

【効】関節リウマチ

【用】(注) 7.5mg を週に 1 回皮下注射する。なお、患者の状態、忍容性等に応じて適宜増量できるが、15mg を超えないこと。

(シロリムス)

▶ラパリムス顆粒 0.2% (劇)

Rapalimus 2mg/g [ノーベルファーマ]

〔薬価〕3,010.2 円/g

【効】下記の難治性脈管腫瘍及び難治性脈管奇形:

・リンパ管腫(リンパ管奇形)、リンパ管腫症、ゴーハム病、リンパ管拡張症

・血管内皮腫、房状血管腫

・静脈奇形、青色ゴムまり様母斑症候群

・混合型脈管奇形、クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

【用】(内) 体表面積が 1.0m² 以上の場合は 2mg、0.6m² 以上 1.0m² 未満の場合は 1mg を開始用量とし、1 日

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室(内線 7083)までご連絡下さい。

(文責: 丹羽今日子)

1 回投与する。以後は、血中トラフ濃度や患者の状態により投与量を調節するが、1 日 1 回 4mg を超えないこと。

体表面積が 0.6m² 未満の場合は、月齢に応じて開始用量を下記のとおりとし、1 日 1 回投与する。以後は、血中トラフ濃度や患者の状態により投与量を調節するが、下記の最大用量を超えないこと。

[月齢/1 日あたり開始用量(最大 1mg まで)/1 日あたり最大用量(最大 4mg まで)]

・3 ヶ月未満 / 0.02mg/kg / 0.08mg/kg

・3 ヶ月以上 6 ヶ月未満 / 0.04mg/kg / 0.16mg/kg

・6 ヶ月以上 12 ヶ月未満 / 0.06mg/kg / 0.24mg/kg

・12 ヶ月以上 / 0.08mg/kg / 0.32mg/kg

(ジクアホソルナトリウム)

▶ジクアス点眼液 3%

Diquas (3%)5mL/本

[参天]

〔薬価〕358.3 円/瓶

【効】ドライアイ

【用】(外) 1 回 1 滴、1 日 6 回点眼する。