



内服抗がん薬について 薬剤名称の前に「▼」マークを付与します

これまで当院では安全対策の一環として、使用上の注意が必要な薬剤について電子カルテの薬剤名称の前に下表のように記号を付与していました。今回、当院にて内服抗がん薬に関するインシデントが発生していることから、再発防止のために内服抗がん薬についても「▼」マークを付与することといたしました。

11月5日(水)より全ての内服抗がん薬について上記の記号が付与されますので、処方オーダー時や投薬時などの注意喚起として、ご活用ください。

○使用中の添付記号

- ★：抗凝固薬、抗血小板薬
- ：血糖降下薬、インスリン
- ▲：β遮断薬
- ：オピオイド
- ◆：ステロイド
- ：転倒・転落リスク薬

★バイアスピリン錠100mg
1回1錠 (1日1錠)
●メトグルコ錠250mg
1回1錠 (1日1錠)
▲ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」
1回1錠 (1日1錠)
■トラマールOD錠25mg
1回1錠 (1日1錠)
◆プレドニン錠5mg
1回1錠 (1日1錠)
○プロチゾラム錠0.25mg「トーフ」
1回1錠 (1日1錠)

NEW

- ▼：内服抗がん薬
(ホルモン剤を含む)



新しい記号は患者が使用している内服抗がん薬の把握や投薬時の注意喚起で利用してください。

▼カベシタピン錠300mg「ヤクルト」
1回1錠 (1日1錠)

不明な点につきましては、薬剤部・医薬品情報管理室(内線 7083)までご連絡下さい。

(文責：北川 智也)